



Informationen zu ausgewählten ackerbaulichen Maßnahmen in FAKT II und im Rahmen der Öko-Regelungen bei den Direktzahlungen

STAND: 30.10.2023



Landwirtschaftliches
Technologiezentrum
Augustenberg



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LÄNDLICHEN RAUM
UND VERBRAUCHERSCHUTZ

Inhalt

1	Einleitung	3
2	Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau (FAKT II E1.2)	7
2.1	Zielsetzung	7
2.2	Was wird verlangt?	9
2.3	Tipps zur Umsetzung	10
3	Brachebegrünung mit Blühmischungen in FAKT II und Brachflächen mit und ohne Blühmischung als Öko-Regelung 1a oder 1b im Rahmen der Direktzahlungen	11
3.1	Zielsetzung	11
3.2	Was wird für Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland im Rahmen der Öko-Regelung 1b verlangt?	12
3.3	FAKT II-Maßnahme E7: Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)	12
3.3.1	Was wird verlangt?	12
3.3.2	Mischungen	13
3.4	FAKT II-Maßnahme E8: Brachebegrünung mit mehrjährigen Blühmischungen	14
3.4.1	Was wird verlangt?	14
3.4.2	Mischungen	14
3.5	Tipps zur Umsetzung	18
4	Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II-Maßnahmen	21
5	FAKT-Maßnahme E9: Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)	22
5.1	Zielsetzung	22
5.2	Was wird verlangt?	22
5.3	Tipps zur Umsetzung	22
6	FAKT II-Maßnahmen E13.1 „Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker)“ und E13.2 „Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide“	23
6.1	Zielsetzung	23
6.2	Was wird verlangt?	23
6.3	Sonderregelungen für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe	23
6.4	Tipps zur Umsetzung	23
7	FAKT II-Maßnahme E14 und E15: „Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen“ und „Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen“	25
7.1	Zielsetzung	25
7.2	Was wird verlangt für E14?	26
7.3	Was wird verlangt für E15?	26
7.4	Tipps zur Umsetzung	26
8	FAKT II-Maßnahme F3: Precision Farming (teilflächenspezifische N-Düngung)	28
8.1	Zielsetzung	28
8.2	Was wird verlangt?	28
8.3	Umsetzung der Ziele	28
8.4	Weitere Vorgaben	29
8.5	Dokumentation	30
9	FAKT II-Maßnahme F4: reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Verfahren	31
9.1	Zielsetzung	31
9.2	Was wird verlangt?	31
9.3	Tipps zur Umsetzung	32
10	Literatur	33

1 Einleitung

Das 2015 eingeführte und nun weiterentwickelte baden-württembergische Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT II) umfasst rund 40 Einzelmaßnahmen. Diese Maßnahmen dienen dem Erhalt und der Pflege der Kulturlandschaft, dem Schutz des Klimas und der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden, Luft, der Förderung der artgerechten Tierhaltung und dem Erhalt und der Förderung der Biodiversität. In dieser Broschüre werden für ausgewählte ackerbauliche FAKT II-Maßnahmen die Voraussetzungen dargestellt (Stand: Mai 2023) und Hinweise zur ackerbaulichen und besonders natur- und umweltfreundlichen Umsetzung gegeben. Da ackerbauliche Maßnahmen auch im Rahmen der erweiterten Konditionalität (GLÖZ-Standards) von Bedeutung sind, werden diese Zusammenhänge ebenfalls dargestellt, sowie Kombinationsmöglichkeiten mit ausgewählten Öko-Regelungen der 1. Säule. Letztere werden ab 2023 für Landwirtinnen und Landwirte freiwillig wählbar sein. Hier gibt es bundesweit sieben Maßnahmen, mit denen zusätzliche Beiträge für Umwelt-, Biodiversitäts- und Klimaschutz erbracht werden. Sie sind freiwillig, einjährig und müssen jedes Jahr neu beantragt werden.

Bei den aufgeführten ackerbaulichen FAKT II-Maßnahmen werden je nach Maßnahme besondere Schwerpunkte gesetzt.

- Die FAKT II-Maßnahmen „Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen“ (E7), „Brachebegrünung mit mehrjährigen Blühmischungen“ (E8), „Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)“ (E9), „Erweiterter Drillreihenabstand im Getreide (Lichtäcker)“ (E.13.1) und „Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat im Getreide“ (E13.2), „Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen“ (E14), „Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen“ (E15) und „Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Verfahren“

Genaue fördertechnische Bestimmungen und Angaben zur Höhe der Fördersätze bei den verschiedenen FAKT II- Maßnahmen und Öko-Regelungen sind den Antragsunterlagen/Erläuterungen zum Gemeinsamen Antrag und der FAKT II-Broschüre zu entnehmen. Die Fördervoraussetzungen können im Rahmen dieser Broschüre nur grob umrissen werden.

(F4) werden flächendeckend auch in Wasserschutzgebieten angeboten (Normal-, Problem- und Sanierungsgebiete). „Precision Farming (teilflächenspezifische N-Düngung)“ (F3) kann nicht auf Flächen beantragt werden, für die Aufzeichnungspflichten nach § 7 Abs. 2 SchALVO bestehen.

- Die FAKT II-Begrünungsmaßnahme „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau“ (E1.2) ist nur auf Flächen außerhalb der Problem- und Sanierungsgebiete von Wasserschutzgebieten und außerhalb von Nitratgebieten nach § 13a Düngeverordnung förderfähig. Flächen innerhalb dieser Gebiete werden jedoch zur Erfüllung des Verpflichtungsumfangs angerechnet.
- Eine flächenbezogene kommunale Förderung für Blühflächen und eine gleichzeitige Förderung über die FAKT II-Maßnahmen E1.2, E7, E8, E13.2, E14 und E15 ist nicht zulässig.

Weitere Hinweise sind auf den Internetseiten des Infodienstes der Landwirtschaftsverwaltung unter www.landwirtschaft-bw.info zu finden:

- Informationen zur neuen GAP und den Ökoregelungen des Bundes unter [https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/Lde/Startseite/Agrarpolitik/GAP-Strategieplan+ Foerderperiode+2023+-+2027](https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/Lde/Startseite/Agrarpolitik/GAP-Strategieplan+Foerderperiode+2023+-+2027)
- Informationen zum Gewässerschutz unter https://lw.landwirtschaft-bw.de/pb/Lde/Startseite/Pflanzenproduktion/Boden_und+Gewaesserschutz
- Informationen zu FAKT II unter: [https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Agrarumwelt+Klimaschutz+und+Tierwohl+ FAKT+II_](https://foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/Lde/Startseite/Foerderwegweiser/Agrarumwelt+Klimaschutz+und+Tierwohl+FAKT+II_)

Die flächenbezogenen ackerbaulichen FAKT II-Maßnahmen können teilweise miteinander kombiniert werden, d. h., dass auf der Fläche eine gleichzeitige Förderung möglich ist. In Tabelle 1 sind einige Kombinationsmöglichkeiten dargestellt.

Zu beachten ist, dass auf Flächen, die im Rahmen von FAKT II E7 oder E8 gefördert werden, keine zusätzliche FAKT II Förderung für Ökobetriebe erfolgen kann (kein D2) und dass die gleichzeitige Beantragung von ÖR1a und ÖR1b und FAKT II E7 bzw. E8 auf derselben Fläche nicht möglich ist.

Um gesetzliche Auflagen, aber vor allem auch die umwelt- und naturschutzfachlichen Zielsetzungen zu erfüllen, sind viele FAKT II-Maßnahmen und Öko-Regelungen bis zu bestimmten Terminen zu etablieren und es gibt Auflagen

zur Flächengröße, zur Nutzung und zu Ruhepausen. Eine Übersicht findet sich in Tabelle 2.

Die Qualitätsanforderungen an das Saatgut für die FAKT II-Maßnahmen E1.2, E7, E8, E13.2, E14 und E15 wurden präzisiert und sind verbindlich einzuhalten (siehe Punkt 4).

TABELLE 1: KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN AUSGEWÄHLTER AKERBAULICHER FAKT II-MASSNAHMEN UND AUSGEWÄHLTER ÖKO-REGELUNGEN

Die vollständige Tabelle ist im Internet unter <https://foerderung.landwirtschaft-bw.de> >Agrarpolitik > GAP-Strategieplan >Unterlagen zu den Förderprogrammen zu finden.

X x/a kR¹⁾ - o Bedeutet, dass auf der Fläche eine gleichzeitige Förderung möglich ist. bedeutet, dass auf der Fläche eine gleichzeitige Förderung bei Absenkung des Fördersatzes möglich ist. Ökobetrieb kann die jeweilige Maßnahme durchführen, erhält für die entsprechende Maßnahme aber keine zusätzliche Förderung für den Ökolandbau (aus der Erzeugung genommene Teilflächen sind grundsätzlich nicht förderfähig im Rahmen von D2). Ablehnung auf der Einzelfläche aufgrund Doppelförderung oder gesamtbetriebliche Maßnahmen die sich gegenseitig ausschließen Messerbaalkenschnitt nur in Kombination mit FAKT II Grünlandmaßnahme möglich		Bedeutet, dass auf der Fläche eine gleichzeitige Förderung möglich ist.																								
		ÖR 1a	ÖR 1b	ÖR 2	ÖR 6	D 2	D 2	D 2	D 2	E 1.2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11	E 12	E 13.1	E 13.2	E 14	E 15	F 3	F 4
		Ökolandbau (Einführung)	Ökolandbau (Beibehaltung)	Ökolandbau - Ausgleich Transaktionskosten	Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau	Herbizidverzicht im Ackerbau	Ausbringung von Trichogramma bei Mais	„Nützlingseinsatz im Gewächshaus oder Folientunnel“	Pheromononeinsatz im Obstbau	Anlage von Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)	„Brachebegrünung mit mehrjährigen Blümmischungen“	Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)	„Mehrjähriger leguminosenbetonter Ackerfütterbau“	Herbizidfreie Bewirtschaftungssysteme in Dauerkulturen	Fungizidverzicht im Winterweizen-, -dinkel-, -triticaleanbau bis zum Ährenschieben (EC 49)	Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker)	Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide	Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen	Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen	Precision Farming (teilflächenspezifische N-Düngung)	Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip Till-Verfahren					
		Ökolandbau (Einführung)	Ökolandbau (Beibehaltung)	Ökolandbau - Ausgleich Transaktionskosten	Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau	Herbizidverzicht im Ackerbau	Ausbringung von Trichogramma bei Mais	„Nützlingseinsatz im Gewächshaus oder Folientunnel“	Pheromononeinsatz im Obstbau	Anlage von Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)	„Brachebegrünung mit mehrjährigen Blümmischungen“	Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)	„Mehrjähriger leguminosenbetonter Ackerfütterbau“	Herbizidfreie Bewirtschaftungssysteme in Dauerkulturen	Fungizidverzicht im Winterweizen-, -dinkel-, -triticaleanbau bis zum Ährenschieben (EC 49)	Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker)	Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide	Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen	Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen	Precision Farming (teilflächenspezifische N-Düngung)	Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip Till-Verfahren					
		Ökolandbau (Einführung)	Ökolandbau (Beibehaltung)	Ökolandbau - Ausgleich Transaktionskosten	Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau	Herbizidverzicht im Ackerbau	Ausbringung von Trichogramma bei Mais	„Nützlingseinsatz im Gewächshaus oder Folientunnel“	Pheromononeinsatz im Obstbau	Anlage von Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)	„Brachebegrünung mit mehrjährigen Blümmischungen“	Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)	„Mehrjähriger leguminosenbetonter Ackerfütterbau“	Herbizidfreie Bewirtschaftungssysteme in Dauerkulturen	Fungizidverzicht im Winterweizen-, -dinkel-, -triticaleanbau bis zum Ährenschieben (EC 49)	Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker)	Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide	Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen	Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen	Precision Farming (teilflächenspezifische N-Düngung)	Reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip Till-Verfahren					

TABELLE 2: TERMINE UND BEARBEITUNGSAUFLAGEN FÜR AUSGEWÄHLTE FAKT II-MASSNAHMEN UND ÖKO-REGELUNGEN

Maßnahme	Mindestfläche/ Mindestmaße	Aussaat	Mulchen/Einarbeiten/ Walzen	Ruhephasen bei mehrjährigen Maßnahmen	Pflegemaßnahme
E1.2	–	bis 31.8.	ab 16.1. des Folgejahres		Beweidung durch Wanderschäfer möglich
Zwischenfrucht im Rahmen von GLÖZ 7 (Fruchtwechsel)	Fruchtwechsel durch Anbau einer Zwischenfrucht oder infolge einer Untersaat auf max. 66 % der AF	vor 15.10.	ab 16.2. des Folgejahres		–
ÖR1b "Blühstreifen/-flächen auf Ackerland"	Mindestgröße 0,10 ha; bei streifenförmiger Aussaat Mindestbreite von 5 m; begünstigungsfähig sind Blühstreifen/-flächen bis zu einer Höchstgröße von jeweils 3 ha	bis 15.05., Nachsaat zulässig bei unzureichendem Aufgang	es gilt der 31.12.; ausnahmsweise kann bei Flächen im 2. Jahr der Beantragung als ÖR1b die Vorbereitung von Winterungen, die erst im Folgejahr zur Ernte kommen, ab dem 1.9. erfolgen.	Pflegeverbot von 1.4.-15.8.	Mindesttätigkeit nur in jedem 2. Jahr erforderlich; Aussaat der Blühmischung gilt als Mindesttätigkeit
E7	Mindestgröße 0,3 ha; Mindestbreite 10 m	bis 15.05.; im ersten Jahr auch im Spätsommer/ Herbst des Vorjahres möglich	im letzten Jahr der Verpflichtung bei Winterung als Folgekultur ab 01.09., bei Sommerungen als Folgekultur ab 16.01.	Winterruhe bis einschl. 15.1.	keine
E8	max. 10 ha und 50 % AF des Betriebes, Mindestbreite 5 m	Spätsommer/ Herbst Vorjahr oder bis spätestens 15.05.	bei Winterung als Folgefrucht ab 01.09. im letzten Verpflichtungsjahr, bei Sommerung als Folgefrucht ab 16.01. des Folgejahres	generell kein Befahren/ Pflege etc.	Schröpfschnitt/ Neuaussaat/ Nachsaat nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde
E13.2	–	Die Aussaat der Untersaatmischung muss bis spätestens vor Auflaufen des Getreides (BBCH 09) erfolgen.	ab 01.09.	mechanische Unkrautregulierung ist ab der Aussaat der Untersaat unzulässig.	–
E14	max. 10 ha	–	nach Abschluss der Ernte im vierten auf das Erstjahr folgenden Jahr	Winterruhe zwischen 15.9. und 15.3.	Schnittnutzung mindestens einmal/ Jahr ab zweitem Antragsjahr ab dem 15.7. bis spätestens 14.9.; Neuaussaat mit Zustimmung der zuständigen ULB möglich
E15	max. 10 ha; Mindestbreite der Wildpflanzenmischungen 6 m. Die Fläche der mehrjährigen Biomassepflanzen darf je Schlag einen Flächenanteil von 90 Prozent und eine Breite von 60 m nicht überschreiten.	–		Wildpflanzenmischung: Winterruhe zwischen 15.9. und 15.3.	Wildpflanzenmischung: Schnittnutzung mindestens einmal/ Jahr ab zweitem Antragsjahr ab dem 15.7. bis spätestens 14.9.; Neuaussaat mit Zustimmung der zuständigen ULB möglich



Abb. 1: Artenreiche Zwischenfruchtmischung, wie sie auch für Maßnahme E1.2 zulässig ist.

Foto: Dr. Margarete Finck

2 Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau (FAKT II E1.2)

Der Anbau von Zwischenfrüchten kann im Rahmen von FAKT II mit Mischungen aus mindestens fünf Arten (E1.2) gefördert werden. Zwischen zwei Begrünungen auf einer Fläche muss dabei in jedem Fall eine Hauptkultur stehen. Die Maßnahme ist flächendeckend außerhalb der Problem- und Sanierungsgebiete von Wasserschutzgebieten und außerhalb von Nitratgebieten nach § 13a Düngerverordnung möglich. Die Maßnahme kann im Rahmen der erweiterten Konditionalität auch für GLÖZ 6 und/oder GLÖZ 7 gelten, wenn die entsprechenden Vorgaben bzgl. Terminen etc. eingehalten werden (für GLÖZ 6 grundsätzlich Begrünung 15.11.–15.01., außer bei frühen Sommerkulturen (15.09.–15.11.) und auf schweren Böden (Tongehalt mind. 17 %: ab Ernte bis 01.10.)). Hierbei ist zu beachten, dass für Ackerflächen, die als erosionsgefährdet eingestuft sind (KWasser1 oder KWasser2), weitergehende Regelungen gelten.

2.1 Zielsetzung

Zwischenfrüchte erfüllen eine Vielzahl von ökologischen und agronomischen Funktionen. Nährstoffe werden über den Winter in Biomasse konserviert und dadurch nicht in das Grundwasser ausgewaschen. Der Anbau von Zwischenfrüchten reduziert das Risiko von Wassererosion und Abschwemmung wirkungsvoll und leistet zusammen mit der Mulchsaat der Sommerungen einen wichtigen Beitrag,

um das Risiko des Eintrags von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln in die Oberflächengewässer zu reduzieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Zwischenfrüchte sich gut entwickeln und über Winter so lange wie möglich auf der Fläche belassen werden.

Durch die mit Zwischenfruchtanbau einhergehende Bodenbedeckung, durch die intensive Durchwurzelung (vor allem bei winterharten Zwischenfrüchten) und durch die Zufuhr von organischer Masse leistet Zwischenfruchtanbau einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der biologischen Aktivität und zur Verbesserung der Aggregatstabilität des Bodens.

Die Aussaat von Artenmischungen bewirkt im Vergleich zu Reinsaaten, vor allem durch die vielseitigere Durchwurzelung, eine intensivere Krümelung und Lebendverbauung des Bodens. Eine Beimischung von Leguminosen wirkt sich hierbei besonders positiv aus und puffert ggf. Stickstoffmangel während der Hauptwachstumszeit wirksam ab. Manche Arten, wie zum Beispiel Phacelia, Lupinen oder Buchweizen, können Phosphor mobilisieren. Eine Zusammenfassung von über 100 wissenschaftlichen Studien kommt zu dem Ergebnis, dass Zwischenfruchtmischungen aus Leguminosen und Nicht-Leguminosen, im Gegensatz zu Reinsaaten, die Erträge der Folgefrucht im Schnitt um 13 % erhöhen (Abdallah et al. 2019). Außerdem können Mischungen Wetterextreme oft besser ausgleichen.

Zwischenfrüchte können die Vielfalt des Bodenlebens fördern, haben aber aufgrund der meist kurzen Standzeit keine positiven Effekte auf die Vielfalt nicht-bodenbewohnender Arten.

TABELLE 3: ZULÄSSIGE ARTEN FÜR KULTURPFLANZENMISCHUNGEN ZUM ZWISCHENFRUCHTANBAU FÜR DIE FAKT II-MASSNAHME E1.2

5 Komponenten nötig, Mindest-Samenanteile siehe Text. Die Artenliste liegt derzeit mit zugehörigem TKM den Berechnungen zur Einhaltung der Förderkriterien zugrunde, kann aber in Zukunft auf Antrag der Saatgutfirmen unter Angabe der zugehörigen TKM erweitert werden.

Gräser				
Bastardweidelgras (<i>Lolium x boucheanum</i>)	Deutsches Weidelgras (<i>Lolium perenne</i>)	Einjähriges u. Welsches Weidelgras (<i>Lolium multiflorum</i>)	Knaulgras (<i>Dactylis glomerata</i>)	Rauhafer (<i>Avena strigosa</i>)
Wiesenschweidel (<i>Festulolium</i>)	Sorghumhirse (<i>Sorghum bicolor</i>)	Sudangras (<i>Sorghum sudanense</i>)	Sorghumhybriden (<i>Sorghum bicolor</i> x <i>Sorghum sudanense</i>)	
Andere Arten				
Ackerbohne (<i>Vicia faba</i>)	Alexandrin Klee (<i>Trifolium alexandrinum</i>)	Abessinischer Senf (<i>Brassica carinata</i>)	Blasenfrüchtiger Klee (<i>Trifolium vesiculosum</i>)	Blaue Lupine (<i>Lupinus angustifolius</i>)
Bockshornklee (<i>Trigonella foenum-graecum</i>)	Borretsch (<i>Borago officinalis</i>)	Braunellen (<i>Prunella spp.</i>)	Buchweizen (<i>Fagopyrum spp.</i>)	Chia (<i>Salvia hispanica</i>)
Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	Dost (<i>Origanum spp.</i>)	Echtes Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>)	Echtes Labkraut (<i>Galium verum</i>)	Einjährige Luzerne (<i>Medicago scutellata</i>)
Erdklee (<i>Trifolium subterraneum</i>)	Esparsetten (<i>Onobrychis spp.</i>)	Färberdistel, Saflor (<i>Carthamus tinctorius</i>)	Fenchel (<i>Foeniculum vulgare</i>)	Futtererbse (<i>Pisum sativum subsp. arvense</i>)
Futterkohl, Markstammkohl (<i>Brassica oleracea var. medullosa</i>)	Gartenkresse (Lepidium sativum)	Gelbe Lupine (Lupinus luteus)	Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare)	Hopfenklee (Gelbklee) (<i>Medicago lupulina</i>)
Hornschotenklee (<i>Lotus corniculatus</i>)	Ostindischer Hanf (<i>Crotalaria juncea</i>)	Inkarnatklee (<i>Trifolium incarnatum</i>)	Karden (<i>Dipsacus spp.</i>)	Klatschmohn (<i>Papaver rhoeas</i>)
Königskerzen (<i>Verbascum spp.</i>)	Koriander (<i>Coriandrum sativum</i>)	Kornblume (<i>Centaurea cyanus</i>)	Kornrade (<i>Agrostemma githago</i>)	Kümmel (<i>Carum carvi</i>)
Leimkräuter (<i>Silene spp.</i>)	Lein (<i>Linum usitatissimum</i>)	Leindotter (<i>Camelina sativa</i>)	Linse (<i>Lens culinaris</i>)	Linsenwicke (<i>Vicia ervilia</i>)
Luzerne (<i>Medicago sativa</i>)	Malven (<i>Malva spp.</i>)	Mangold (<i>Beta vulgaris subsp. cicla var. cicla</i>)	Margerite (<i>Leucanthemum vulgare</i>)	Mariendistel (<i>Silybum marianum</i>)
Michels Klee (<i>Trifolium michelianum</i>)	Nachtkerzen (<i>Oenothera spp.</i>)	Örettich, Meliorationsrettich (<i>Raphanus sativus</i>)	Pannonische Wicke (<i>Vicia pannonica</i>)	Persischer Klee (<i>Trifolium resupinatum</i>)
Petersilie (<i>Petroselinum crispum</i>)	Phazelie (<i>Phacelia tanacetifolia</i>)	Pippau (<i>Crepis spp.</i>)	Platterbsen außer breitblättrige Platterbse (<i>Lathyrus spp.</i> ohne <i>Lathyrus latifolius</i>)	Purpurwicke, Bengalenwicke, Rotwicke (<i>Vicia benghalensis</i>)
Rainfarn (<i>Tanacetum vulgare</i>)	Ramtillkraut (<i>Guizotia abyssinica</i>)	Raps (<i>Brassica napus</i>)	Rauke, Rucola (<i>Eruca sativa</i>)	Reseden (<i>Reseda spp.</i>)
Ringelblume (<i>Calendula officinalis</i>)	Rotklee (<i>Trifolium pratense</i>)	Saatwicke (<i>Vicia sativa</i>)	Sareptasenf (<i>Brassica juncea</i>)	Schabziger Klee (<i>Trigonella caerulea</i>)
Schwarzer Senf (<i>Brassica nigra</i>)	Schwarzkümmel (<i>Nigella spp.</i>)	Rübsen, Stoppelrüben (<i>Brassica rapa</i>)	Schwedenklee (Bastardklee) (<i>Trifolium hybridum</i>)	Seradella (<i>Ornithopus sativus</i>)
Sojabohne (<i>Glycine max</i>)	Sonnenblume (<i>Helianthus annuus</i>)	Sparriger Klee (<i>Trifolium squarrosum</i>)	Spinat (<i>Spinacia spp.</i>)	Spitzwegerich (<i>Plantago lanceolata</i>)
Steinklee (<i>Melilotus spp.</i>)	Tagetes (<i>Tagetes spp.</i>)	Taubnesseln (<i>Lamium spp.</i>)	Weißer Lupine (<i>Lupinus albus</i>)	Weißer Senf (<i>Sinapis alba</i>)
Weißklee (<i>Trifolium repens</i>)	Wiesenknopf (<i>Sanguisorba spp.</i>)	Wiesensalbei (<i>Salvia pratensis</i>)	Wilde Möhre (<i>Daucus carota subsp. carota</i>)	Wundklee (<i>Anthyllis vulneraria</i>)
Zottelwicke (<i>Vicia villosa</i>)				

2.2 Was wird verlangt?

- Begrünungsaussaat als Blanksaat mit einer Saatgutmischung mit mindestens 5 Arten (s. Mischungen), dabei sind Eigenmischungen von der Förderung ausgeschlossen. Im Landhandel sind Saatgutmischungen erhältlich, deren Mischungsverhältnisse den Vorgaben nach FAKT II E1.2 entsprechen. Die Einhaltung der Kriterien muss mit der Bezeichnung „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau““ auf Lieferschein, Etikett oder Rechnung vermerkt sein. Zudem muss eine Tabelle verfügbar sein, in der die genaue Mischungszusammensetzung und Einhaltung der Kriterien dargestellt ist (s. u.).
- Aussaat der Zwischenfruchtmischungen bis spätestens Ende August mit dem Ziel der ordnungsgemäßen Bestandsentwicklung.
- Keine Nutzung des Aufwuchses (auch im Folgejahr); Ausnahme: Beweidung durch Wanderschäfer ist möglich.
- Mulchen/Einarbeiten/Walzen des Aufwuchses nicht vor dem 16.1. des Folgejahres.
- Ein Einsatz von Herbiziden von der Aussaat der Zwischenfrucht bis zur Einsaat der Nachfrucht ist nicht zulässig. Hiervon ausgenommen ist die Applikation nach dem völligen Absterben oder der mechanischen Zerkleinerung des Zwischenfruchtbestandes unmittelbar zur Vorbereitung der Aussaat der Nachfrucht.
- Zwischen zwei Begrünungen auf derselben Fläche muss in jedem Fall eine Hauptkultur stehen.

Mischungen

- Zur Begrünung müssen vorgegebene Saatgutmischungen mit mind. fünf Mischungskomponenten entsprechend den in Tabelle 3 angegebenen zulässigen Arten verwendet werden.
- Mindestens fünf Arten mit jeweils mind. 5 %-Anteil Samen.
- Eine Art darf keinen höheren Anteil als 50 % an den Samen der Mischung enthalten.
- Gräser max. 60 % Anteil an den Samen der Mischung.
- Es gelten die FAKT II Blühmischungs-Qualitätsvorschriften (u. a. keinerlei Besatz mit *Cuscuta*-Arten; siehe Punkt IV).

Der geforderte Mindestanteil einer Art bezieht sich nicht auf Gewichtsprozente, sondern auf die Anteile der Samen

in einer Mischung, die mit Hilfe der Tausendkornmasse (TKM) ermittelt werden. Das LTZ Augustenberg stellt den Saatgutfirmen einen Zwischenfruchtmischungsrechner zur Verfügung, mit dem sie die Erfüllung der Anforderungen ihrer Mischungen mit vorgegebenen TKMs prüfen können. Nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen dürfen die Saatgutmischungen mit dem Zusatz „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau““ als zulässig für FAKT II E1.2 in den Verkehr gebracht werden.

NEUES VERFAHREN ZUR DOKUMENTATION AB 2023

- Die Saatgutfirmen müssen zusätzlich zum o. g. Zusatz auf Rechnung/Lieferschein/Beiblatt zum Lieferschein oder Etikett ENTWEDER die Tabelle aus dem Zwischenfruchtmischungsrechner exportiert/unverändert kopiert auf dem Lieferschein oder einem Beiblatt zum Lieferschein oder auf der Rechnung abdrucken,
- ODER: Ein PDF mit der Tabelle aus dem Zwischenfruchtmischungsrechner muss für die jeweilige Mischung auf der Homepage der Firma bei den Angaben zur jeweiligen Mischung bereitgestellt werden. Dabei ist auf jeden Fall seitens der Saatgutfirmen darauf zu achten, dass der Mischungsname mit dem jeweiligen Produktionsjahr eindeutig auffindbar ist und nur eine zugehörige Rezeptur hat. Das bedeutet, dass für jedes Produktionsjahr dieses PDF bereitgestellt wird, auch wenn die Rezeptur sich nicht geändert hat. Dabei muss in der Bezeichnung des PDFs der Mischungsname und das Produktionsjahr enthalten sein. Der Mischungsname kann aber über die Jahre gleich bleiben. Bei häufiger als jährlich überarbeiteten Mischungen müssen eindeutig andere Namen vergeben werden. Die Saatgutfirma hat dafür Sorge zu tragen, dass über die gesamte Förderperiode die PDFs für die Mischungen zur Verfügung gestellt werden und abrufbar sowie eindeutig zuzuordnen sind! **Es ist für Landwirtinnen und Landwirte dennoch ratsam, möglichst im Jahr der Aussaat das PDF abzurufen und zu speichern, für spätere Kontrollen.**
- Als Ergebnis dieses Vorgehens haben die Landwirtinnen und Landwirte eine Rechnung, einen Lieferschein, ein Beiblatt zum Lieferschein oder ein Etikett, auf dem der o. g. Zusatzsatz steht UND eine Tabelle, in der die Zulässigkeit für FAKT II E1.2 mit Hilfe des Mischungsrechners dokumentiert ist.

- Alte Zwischenfruchtmischungen, die vor 2023 gekauft oder hergestellt und vom LTZ Augustenberg zugelassen wurden und auf der damals noch geführten LTZ-Liste stehen, dürfen aufgebraucht oder abverkauft werden, sofern die Rechnung oder der Lieferschein den Zusatz „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau““ enthält. Die Liste ist im Jahr 2023 daher weiterhin auf der Homepage des LTZ einsehbar. Hierfür müssen die Landwirtinnen und Landwirte keine Tabelle vorlegen und die Saatgutfirmen müssen keine Tabellen zur Verfügung stellen.
- In engen Getreidefruchtfolgen sollte der Anbau von Gräsern und Getreidearten als Zwischenfrüchte nur eingeschränkt erfolgen (Zwischenwirte und grüne Brücke für Pilzkrankheiten und Schädlinge wie z. B. Getreideblattläuse).
- In Kartoffelfruchtfolgen sollten wegen der Übertragung des bodenbürtigen Rattlevirus (Eisenfleckigkeit) weder Senf noch Phacelia als Zwischenfrucht angebaut werden.
- Bei Leguminosen als Nachfrucht sollte die Mischung leguminosenfrei sein, bei grobkörnigen Leguminosen in der Fruchtfolge sollte auf grobkörnige Leguminosen in der Zwischenfruchtmischung verzichtet werden.
- Beim Anbau von Zuckerrüben und anderen von Nematoden gefährdeten Kulturen sind nematodenresistente Sorten zu bevorzugen, die den Schlupf von Nematoden anregen und als Fehlwirt dienen.
- Wenn die Vorfrucht viel Stickstoff hinterlässt, sollte ein hoher Anteil Nicht-Leguminosen in der Mischung sein.

2.3 Tipps zur Umsetzung

AUSWAHL DER MISCHUNGSKOMPONENTEN/ EINORDNUNG IN FRUCHTFOLGE

- Für eine erfolgreiche Etablierung von Zwischenfrüchten sind die Wahl der Zwischenfruchtarten und die Stellung der Zwischenfrucht zwischen zwei Hauptfruchtarten entscheidend. Damit den Pflanzen ausreichend Wärme und Wasser aus Niederschlägen und/oder Bodenwasservorräten zur Verfügung stehen, bietet sich besonders die Stellung der Zwischenfrucht nach Winterungen vor Sommerungen an.
- Bei der Auswahl der Zwischenfruchtmischung sind insbesondere in höheren Lagen die Temperatursprüche, die Spätsaatverträglichkeit, die Frosthärte und die Konkurrenzkraft gegenüber Ausfallgetreide, Verunkrautung und Verungrasung entscheidend.
- In milden Lagen sollte, besonders bei früherer Aussaat, bei der Auswahl der Zwischenfruchtmischung darauf geachtet werden, dass die Mischungsbestandteile entweder möglichst spät in die generative Phase (Blüte) kommen oder entsprechend frostempfindlich sind, um ein Aussamen der Zwischenfrucht zu vermeiden.

Außerdem muss Folgendes berücksichtigt werden, um negative Fruchtfolgeeffekte zu vermeiden:

- Pflanzenarten, die in der Fruchtfolge als Hauptfrucht angebaut werden, sollten nicht als Zwischenfrucht angebaut werden.
- In Raps- und Gemüsefruchtfolgen mit Kohl sollten Kreuzblütler wie Senf, Ölrettich, Rübsen oder Markstammkohl nicht als Zwischenfrüchte ausgesät werden (Wirtspflanzen für verschiedene Kreuzblütlerkrankheiten wie z. B. Kohlhernie).

AUSSAAT

- Für eine erfolgreiche Etablierung ist eine sofortige Aussaat der Zwischenfrucht direkt nach Ernte der Hauptfrucht zu empfehlen, da die „unproduktive Wasserverdunstung“ mit Beseitigung des Bestandes sprunghaft ansteigt.
- Zwischen der Ernte der Vorkultur und der Aussaat der folgenden Hauptkultur sollten mindestens 50 Vegetationstage mit Tagesdurchschnittstemperaturen über 9 °C liegen.
- Die Aussaat mit der Sämaschine ist bei Zwischenfruchtmischungen den anderen Aussaattechniken vorzuziehen, eine Aussaat mit dem Schleuderstreuer ist wegen des Entmischungsrisikos nicht empfehlenswert.
- Die empfohlenen Mindestaussaatmengen der Saatgutfirmen für die jeweilige Mischung sollten nicht unterschritten werden. Zu lichte Bestände unterdrücken den Ausfallaufwuchs der Vorfrucht und Unkräuter ungenügend und haben ein geringeres Nährstoffanreicherungsvermögen.
- Bei herbizidempfindlichen Zwischenfrüchten und zur Bekämpfung von ausgesamten oder nicht abgestorbenen Zwischenfrüchten in der Sommerung ist ggfs. die Herbizidstrategie in der Fruchtfolge anzupassen.

TERMINIERUNG

Fördertechnisch ist bei der Maßnahme „Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau“ (Maßnahme E1.2) ein Mulchen/Einarbeiten/Walzen ab 16.1. möglich. Zu diesem Termin endet auch spätestens die Anforderung an die

Mindestbodenbedeckung im Rahmen von GLÖZ 6. Um die mit dem Zwischenfruchtanbau verbundenen Ziele zum Wasser- und Erosionsschutz zu erreichen, ist es jedoch unter Berücksichtigung der jeweiligen Standortverhältnisse und der Fruchtfolge anzustreben, die Zwischenfrüchte möglichst lange auf der Fläche zu belassen. Wird die Zwischenfrucht im Rahmen von GLÖZ 7 als Fruchtwechsel genutzt, muss sie bis einschließlich 15.2. auf der Fläche bleiben; gegebenenfalls sind die Vorgaben für Ackerflächen in der Erosionskultus zu beachten. Zur Förderung des Bodenlebens ist ein Zerkleinern durch Walzen oder Mulchen der Zwischenfruchtmischungen und mischendes Einarbeiten dem Einpflügen noch stehender grüner Bestände vorzuziehen.

3 Brachebegrünung mit Blühmischungen in FAKT II und Brachflächen mit und ohne Blühmischung als Öko-Regelung 1a oder 1b im Rahmen der Direktzahlungen

In FAKT II werden ab 2023 nur noch mehrjährige Blühflächen (FAKT II E8) sowie mehrjährige Brachen mit überjährigen Blühmischungen (FAKT II E7) gefördert. Im Rahmen der Öko-Regelungen ist die Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität und Erhaltung von Lebensräumen über GLÖZ 8-Brachen hinaus als Öko-Regelung 1 förderbar. Hierbei können Flächen als ÖR 1a (Nichtproduktive Flächen auf Ackerland) u. a. auch der Selbstbegrünung überlassen werden. Es können aber auch im Rahmen der Öko-Regelung 1b (Anlage von Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland) Blühmischungen ausgesät werden. In Problem- und Sanierungsgebieten von Wasserschutzgebieten sind die Auflagen der SchALVO einzuhalten. Sowohl auf Brach- als auch auf Blühflächen ist der Einsatz von Düngemitteln (einschließlich Wirtschaftsdünger) und Pflanzenschutzmitteln nicht erlaubt.

3.1 Zielsetzung

Selbstbegrünte Brachflächen, wie sie unter GLÖZ 8 oder ÖR 1a möglich sind, können auf geeigneten Standorten sehr wertvolle Biodiversitätsflächen sein: Sie bringen dann eine große Vielzahl standortangepasster und ggf. auch gefährdeter Ackerwildkrautarten hervor, die genau auf die am Standort vorkommenden Tierarten "zugeschnitten" sind. Sinnvoll ist dies vor allem für Flächen, die mager sind (AZ<20, arme Sandstandorte/ Kalkscherbenäcker o. ä.), keine oder wenige besonders konkurrenzstarke Unkräuter oder Ungräser aufweisen und auf denen oder in deren Nähe noch Restbestände evtl. gefährdeter Ackerwildkräuter vorhanden sind. Doch auch Standorte mit Kamillen, Kornblumen oder Mohnarten sind wahre Insektenmagneten.

Auch durch die Aussaat von Blühmischungen lassen sich etwas produktivere Ackerflächen zu wertvollen Bunt- oder Blühbrachen und damit zu Lebensräumen für die wildlebende Flora und Fauna entwickeln. Es wird ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Nahrungsangebot für Insekten

Mehrfährige Blühmischungen für die Biodiversität



Was sehen Sie hier?

Auf diesem Feld wurde eine Blühmischung ausgesät, die mehrere Jahre ohne Bearbeitung stehen bleibt. Ab dem zweiten Jahr blühen hier viele heimische Wildpflanzen. Die Flächen dürfen normalerweise nicht bearbeitet werden und sehen daher über den Winter oft unordentlich aus. Das ist allerdings zur Förderung möglichst vieler Arten besonders wichtig.

Warum sind mehrjährige Blühflächen so wichtig?

Durch den Artenreichtum der Mischung ist über die gesamte Vegetationsperiode Nahrung für verschiedene, auch gefährdete Tierarten verfügbar. Feldvögel können bei ausreichender Größe ungestört nisten. Die Flächen bieten Schutz und Deckung, z. B. für Insekten und Spinnen, die in abgestorbenen Pflanzenteilen überwintern.



Wie fördert das Land mehrjährige Blühflächen?

In Baden-Württemberg wird die Anlage mehrjähriger Blühflächen über das Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl (FAKT) gefördert.



Informationen: Landwirtschaftliches Versuchsgut Augustenberg (LTZ), Neffernwald 21, 70271 Karlsruhe, Tel. 07121/5040-0, poststelle@ltz-bw.de, www.ltz-augustenberg.de, Koelliker-Dr. Julia Wölke, Lantana Jungkorn

10/2021



Landwirtschaftliches
Versuchsgut
Augustenberg



Baden-Württemberg

Um die Bevölkerung über die mehrjährige Blühmischung, die über den Winter oft „wild“ aussieht, zu informieren, können am Feldrand Informationstafeln aufgestellt werden. Eine fertige Druckvorlage für ein Schild im Format DIN A3 kann auf den Internetseiten des LTZ Augustenberg heruntergeladen werden: www.LTZ-Augustenberg.de > Arbeitsfelder > Landwirtschaft und Umwelt > Biodiversität > Blühmischungen und Blütenbestäuber.

aller Art geschaffen. Auch Niederwild und Feldvögel können hier Nahrung und Schutz finden. Die Vielfalt an Farben, Formen und Struktureffekten werten das Landschaftsbild besonders in ackerbaulich geprägten Landschaften deutlich auf. Während einjährige Mischungen vor allem aus Kulturformen bestehen und für kurze Zeit Nahrung für eher generalistische Arten bieten (z. B. Honigbienen), fördern zwei- oder mehrjährige Blühflächen durch den hohen Anteil einheimischer Wildpflanzen ab dem zweiten Standjahr viele verschiedene, auch seltene, Insektenarten (v. a. Maßnahmen E7 und E8; auch zweijährige ÖR 1b). In überwinternden Beständen können Feldvögel Samen, Niederwild Deckung und Insekten Überwinterungsmöglichkeiten finden (beispielsweise in hohlen Pflanzenstengeln und in der Streu). Außerdem ziehen sich hier viele Nützlinge zurück, die in den angrenzenden Kulturen zur Schädlingsbekämpfung beitragen können.

Mischungen, die bereits im Spätsommer gesät werden, etablieren sich nicht nur meistens besser, sondern schützen im Winter den Boden vor Erosion und blühen schon ab April, was für früh im Jahr aktiv werdende Bestäuber sehr wichtig ist. Durch die durchgehende Begrünung bei Aussaat von Mischungen im Herbst wird die Konservierung von Nährstoffen vor dem Winter

und eine starke Durchwurzelung erreicht, was nicht nur die Bodenfruchtbarkeit erhöht, sondern auch den Nährstoffaustrag in Grund- und Oberflächenwasser sowie die Bodenerosion vermindert.

3.2 Was wird für Blühstreifen oder -flächen auf Ackerland im Rahmen der Öko-Regelung 1b verlangt?

Im Rahmen der ÖR 1a können Ackerflächen durch Selbstbegrünung oder Aussaat einer Mischung als nichtproduktive Flächen bereitgestellt werden. Auf diesen Flächen können zusätzlich Blühstreifen oder -flächen angelegt und über die ÖR1b gefördert werden. Die einzelnen Blühstreifen/-flächen müssen mindestens 0,1 ha groß sein. Bei einer streifenförmigen Aussaat muss eine Mindestbreite von 5 m eingehalten werden. Blühstreifen und -flächen können höchstens bis zu einer Größe von 3 ha als begünstigungsfähige Fläche angerechnet werden. Auf den Blühstreifen/-flächen müssen Blühmischungen ausgesät werden, die ausschließlich aus zulässigen Arten zusammengestellt sein dürfen. Dazu stellen die Saatguthändler Mischungen zur Verfügung, die aus den zulässigen Artenlisten zusammengestellt sind. Die für 2023 geltenden bundesweiten Listen sind ab dem Jahr 2024 für Baden-Württemberg leicht gekürzt worden und stehen derzeit noch unter Vorbehalt der Verabschiedung der Zweiten GAP-Reform-Verordnung BW. Die Saatgutfirmen sind jedoch bereits informiert und bieten Saatgut für ÖR1b/c bereits im Hinblick auf die Streichung einiger Arten an, die allermeisten in 2023 zulässigen Mischungen bleiben zulässig (siehe Tabelle A6). Dabei muss eine einjährige Mischung mindestens zehn Arten aus Gruppe A enthalten, die Beimischung von Arten aus Gruppe B ist möglich; eine zweijährige Mischung muss mindestens fünf Arten aus Gruppe A und 5 Arten aus Gruppe B enthalten. Eine Aussaat ist in beiden Fällen bis 15. Mai des Antragsjahres vorzunehmen. Im ersten Standjahr muss die Blühmischungen bis zum 31.12. auf der Fläche stehen bleiben. Im zweiten Jahr darf eine Bodenbearbeitung ab dem 1.9. erfolgen, wenn eine Folgefrucht angebaut wird, die nicht vor Ablauf des Jahres geerntet wird. Eine zweijährige Mischung kann nach dem ersten Antragsjahr ohne erneute Aussaat wieder beantragt werden. Im dritten Jahr ist die erneute Aussaat erforderlich. Dünge- und Pflanzenschutzmittel auf Blühflächen oder Blühstreifen sind nicht zulässig.



Abb. 2: Lebensraum für Niederwild (FAKT II-Maßnahme E7)

Foto: René Greiner/Landesjagdverband

3.3 FAKT II-Maßnahme E7: Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (Lebensräume für Niederwild)

3.3.1 WAS WIRD VERLANGT?

Die Maßnahme E7 sieht eine Mindestbreite von zehn Metern bei einer Mindestgröße des förderfähigen Einzelschlags von 0,3 ha vor. Diese Vorgaben helfen, Niederwild und bodenbrütende Arten vor Räubern zu schützen. Nach der Aussaat im ersten Jahr werden jeweils Bodenbearbeitung und Neueinsaat wechselnd auf einer Fläche von mindestens 1/3 bis maximal 2/3 der Förderfläche bis zum 15. Mai durchgeführt (Abb. 3). Dies führt zu unterschiedlichen Höhen und Strukturen und zu einer unterschiedlichen Artenzusammensetzung des Bestandes, was besonders Niederwild fördern kann. Außerdem steht durch die überwinternden Strukturen Deckung und Schutz zur Verfügung. Diese Maßnahme ist im Verpflichtungszeitraum auf derselben Fläche durchzuführen. Aussaat der überjährigen Mischung M3 bzw. M3+ bis spätestens 15. Mai (10–12 kg/ha). Zum ersten Jahr der Verpflichtung kann auch eine Aussaat im Spätsommer des Vorjahres anerkannt werden.

- 1. Jahr:** Einsaat auf kompletter Fläche, keine Pflege
- 2. Jahr:** Neueinsaat auf 50 % der Fläche, 50 % der Fläche: keine Pflege
- 3. Jahr:** Neueinsaat und Brachfläche werden getauscht
 - Winterruhe jedes Jahr bis einschließlich 15. Januar (bei Erstaussaat im Spätsommer des Vorjahres das erste Mal bis 15. Januar des 2. Antragsjahres). Danach Mulchen und Bodenbearbeitung für die Neueinsaat mit M3(+) auf ca. der Hälfte der Fläche (mind. 1/3, max. 2/3). Neueinsaat bis zum 15. Mai. In den Folgejahren Bodenbearbeitung

und Neueinsaat auf der Förderfläche im Wechsel (Abbildung 4).

- Die Anwendung von Düngemitteln und von Pflanzenschutzmitteln ist nicht erlaubt, d. h. auch ein Einsatz von Herbiziden zur Beseitigung des Aufwuchses ist nicht zulässig. Hiervon unberührt ist ein Einsatz von Herbiziden unmittelbar zur Vorbereitung der Aussaat der Nachfrucht im letzten Verpflichtungsjahr, z. B. Wintergetreide. Eine auf die Brachebegrünung folgende Brachebegrünung stellt keine Nachfrucht in diesem Sinne dar. Eine Herbizidanwendung ist daher hier nicht zulässig. Bei zu starker Verunkrautung sollte von einer erneuten Brachebegrünung abgesehen werden.
- Um die ökologische Funktionsfähigkeit des Vorhabens zu gewährleisten, ist eine Mindestbreite der Förderfläche von 10 m erforderlich.
- Im letzten Jahr der Verpflichtung ist eine ackerbauliche Nutzung auf der Förderfläche zur Vorbereitung einer Winterung wieder ab dem 1. September möglich. Bei einer nachfolgenden Sommerung ist eine ackerbauliche Nutzung nicht vor dem 16. Januar des Folgejahres möglich.




Abb. 3: Schematische Darstellung der Maßnahme FAKT II E7. Hier erfolgen nach dem ersten Jahr Bearbeitung und Neuaussaat mit FAKT II-M3(+) jährlich im Wechsel auf der Hälfte der Fläche.

3.3.2 MISCHUNGEN

In der neuen Förderperiode wird die Mischung M3 auf die Mischung M3+ umgestellt (Tabelle 4). Dies erfolgt aufgrund wissenschaftlich-ökologischer Studien, der Rückmeldung von Praktikern und der Problematik von Auskreuzungen in der Saatgutvermehrung. In den Jahren 2023 und 2024 sind beide Mischungen noch zulässig, so dass noch Restbestände der Mischung M3 aufgebraucht werden können. Bevorzugt soll jedoch bereits ab 2023 M3+ zum Einsatz kommen. Ab 2025 gilt grundsätzlich die Mischung M3+. Um Engpässen bei der Vermehrung einzelner Arten vorzubeugen, können für einige Arten auch pauschal (ohne Genehmigungsverfahren) Ersatzarten verwendet werden (Tabelle 4). Es gelten die FAKT II Blümmischungs-Qualitätsvorschriften (siehe Punkt IV).



Abb. 4: Mehrjährige Blümmischung

Foto: Dr. Julia Walter

Sonderregelung für Öko-Saatgutmischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe

Hier dürfen pauschal bis zu fünf Arten der Mischung M3+ weggelassen und durch andere Arten der Mischung ersetzt werden, um eine Teilnahme von Öko-Landwirten an dieser Maßnahme zu ermöglichen.

3.4 FAKT II-Maßnahme E8: Brachebegrünung mit mehrjährigen Blümmischungen

3.4.1 WAS WIRD VERLANGT?

- Förderfähig ist eine Fläche von max. 10 ha je Betrieb und maximal 50 % der gesamten betrieblichen Ackerfläche des ersten Verpflichtungsjahrs.
- Bei streifenförmiger Aussaat ist auf der überwiegenden Länge eine Mindestbreite von fünf Metern einzuhalten.
- Aussaat von vorgegebenen mehrjährigen Blümmischungen mit regionalem Saatgut (s. u.) auf aus der Erzeugung genommenen Ackerflächen.
- Aussaat bereits im Spätsommer/Herbst des Vorjahres oder im Frühjahr bis spätestens 15. Mai im ersten Antragsjahr. Die Aussaatstärke beträgt 8–10 kg/ha.
- Nach Aussaat ist während des gesamten Verpflichtungszeitraums grundsätzlich weder Befahren, Bearbeiten noch Nutzung zulässig.
- Kein Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.
- Die Standzeit beträgt mindestens fünf Jahre. Im letzten Jahr der Verpflichtung ist eine ackerbauliche Nutzung auf der Förderfläche zur Vorbereitung einer Winterung wieder ab dem 1. September möglich. Bei einer nachfolgenden Sommerung ist eine ackerbauliche Nutzung nicht vor dem 16. Januar des Folgejahres möglich.

Gelingt die Etablierung eines geeigneten Bestandes im Jahr der Aussaat nicht (oder Folgejahr bei Spätjahresaussaat), ist die Untere Landwirtschaftsbehörde darüber zu informieren und die Fläche spätestens bis 15. Mai des Folgejahres neu zu bestellen. Bei problematischer Vegetationsentwicklung im Laufe der Verpflichtungsdauer sind nach Zustimmung der Unteren Landwirtschaftsbehörde auf den betroffenen Teilflächen Gegenmaßnahmen wie ein Schröpfschnitt und ggf. eine Neueinsaat zulässig.

3.4.2 MISCHUNGEN

Die Mischungen für die Maßnahme E8 enthalten viele Wildarten, auf die heimische, auch spezialisierte, Tierarten angewiesen sind. Auf ackerbauliche Problemarten wurde verzichtet. Es sind nur Mischungen zulässig, die regionales Wildpflanzensaatgut enthalten. Damit wird vermieden, dass Ökotypen von Arten ausgesät werden, die an weit entfernte Natur- und Klimaräume angepasst sind und damit die heimische Flora genetisch verfälschen. Das bedeutet in diesem Kontext, dass die Ausgangspopulationen des Wildpflanzensaatgutes nur aus Ursprungsgebieten, die ganz oder zu einem nennenswerten Teil in Baden-Württemberg liegen, kommen dürfen (Ursprungsgebiete 9–13, 17 und 21 in Anhang A1).

Es gelten folgende Regeln:

- Auf dem Lieferschein, der Rechnung oder auf dem Etikett müssen die Artenzusammensetzung mit den jeweiligen Gewichtsanteilen der Mischung und die Ursprungsgebiete des Wildpflanzensaatguts verzeichnet sein. Außerdem muss der Zusatz „Die Wildarten sind zertifiziert nach VWW Regiosaaten® bzw. RegioZert® auf Lieferschein, Etikett oder Rechnung stehen. Eine Liste mit Zeichennutzern des VWW Regiosaaten-Zertifikats ist abrufbar unter www.natur-im-vww.de >Bezugsquellen >Gräser und Kräuter
- Eine Liste der Zeichennutzer des RegioZert®-Zertifikats ist abrufbar unter www.bdp-online.de >Branche >RegioZert® > RegioZert® - wo kann ich das Saatgut beziehen?.
- Dabei sind die genannten Ursprungsgebiete und die Artenzusammensetzungen der Tabellen 5 und 6 zu beachten. Etikett, Lieferschein oder Rechnung sind für Kontrollen aufzubewahren. Wenn die Saatgut-Mischungen alle genannten Anforderungen an Artenzusammensetzung und Ursprungsgebiete erfüllen, können sie mit dem Zusatz „zulässig für die FAKT II-Maßnahme E8“ vertrieben werden.

TABELLE 4: DIE MISCHUNGEN M3 BZW. M3+, DIE FÜR DIE MASSNAHME E7 EINGESETZT WERDEN

Anstatt der in der ersten Spalte angegebenen Arten dürfen auch die Ersatzarten in gleicher Menge verwendet werden.

Botanischer Name	Deutscher Name	M3 Gew. %	M3+ Gew. %	Wild-/ Kulturform	Spezifikation	Ersatzarten
<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe	0.1	1	W		<i>Anthriscus sylvestris</i> ; <i>Pastinaca sativa</i>
<i>Agrostemma githago</i>	Kornrade	3	2	W		
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Wundklee	1	1	W/K		<i>Medicago lupulina</i> ; <i>Trifolium dubium</i> ; <i>Trifolium campestre</i>
<i>Borago officinalis</i>	Borretsch	3	3	K		
<i>Brassica oleracea</i> <i>var. medulosa</i>	Markstammkohl	2	0	K		
<i>Brassica rapa</i>	Winterrübsen	4	0	K		
<i>Camelina sativa</i>	Leindotter	0	6	K		
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	1	3	K		
<i>Cichorium intybus</i>	Wegwarte	0	3	W		<i>Hieracium spec.</i> ; <i>Crepis capillaris</i> , <i>Crepis biennis</i> ; <i>Leontodon hispidus</i>
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	1.5	1	W	ungefüllt	<i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesenflockenblume	0.5	2	W		<i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	0	0.1	W		<i>Centaurea scabiosa</i> ; <i>Scabiosa columbaria</i>
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	7	6	K		
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	1	2	W		<i>Anthriscus sylvestris</i> ; <i>Pastinaca sativa</i>
<i>Echium vulgare</i>	Gem. Natternkopf	0.3	0.3	W		<i>Anchusa officinalis</i>
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Buchweizen	10	6	K		
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel	2	4	K		
<i>Helianthus annuus</i>	Sonnenblume	6	3	K	Pollensorte	
<i>Lepidium sativum</i>	Kresse	3	3	K		
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margerite	0.5	2	W		<i>Leucanthemum ircutianum</i>
<i>Linum usitatissimum</i>	Öllein	0	5	K		
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee	1	4	K		<i>Hippocrepis comosa</i>
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne	3	3	K		
<i>Melilotus alba</i>	Weißer Steinklee	0.5	2	W		
<i>Melilotus officinalis</i>	Gelber Steinklee	1	0	W		
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Esparsette	4	6	H	Handelssaatgut	
<i>Origanum vulgare</i>	Oregano	0.1	0.1	W		<i>Thymus pulegioides</i>
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	0.3	0.3	W		
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Phacelie	2	5	K		
<i>Picris hieracioides</i>	Gew. Bitterkraut	0	0.1	W		<i>Hieracium spec.</i> ; <i>Crepis capillaris</i> , <i>Crepis biennis</i> ; <i>Leontodon hispidus</i> ; <i>Hypochaeris radicata</i>
<i>Prunella vulgaris</i>	Gew. Braunelle	0	0.2	W		<i>Betonica officinalis</i> ; <i>Clinopodium vulgare</i> ; <i>Lamium spec.</i>
<i>Secale multicaule</i>	Waldstaudenroggen	12	4	K		
<i>Sinapis alba</i>	Gelbsenf	15	0	K		
<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee	2	3	K		
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnatklee	8	10	K		
<i>Vicia sativa</i>	Saatwicke	3	3.9	K		
<i>Vicia villosa</i>	Zottelwicke	2	0	K		
<i>Vicia faba</i>	Ackerbohne	0	5	K		
<i>Verbascum densiflorum</i>	Großblütige Königskerze	0.2	0	W		

- Die Namensbausteine der Mischungen müssen beim Vertrieb erhalten bleiben. Das bedeutet, dass sowohl FAKT II E8, als auch die Mischungsnamen in den Bezeichnungen auftauchen müssen. Die Namen liefern den Landwirten wichtige Standortinformationen und erleichtern Kontrollen. Beispielsweise: „Lebendiger Acker trocken FAKT II E8“ oder auch „FAKT II E8 lebendiger Acker trocken“.

Zulässige Mischungen (vgl. Tabellen 5 und 6):

- Die Mischungen „Blühende Landschaft mehrjährig West FAKT II E8“ (Aussaart im Ursprungsgebiet 9 (Oberrheingraben) und 10 (Schwarzwald) gemäß Abbildung A1 im Anhang empfohlen) und „Blühende Landschaft mehrjährig Süd FAKT II E8“ (Aussaart in allen anderen Ursprungsgebieten Baden-Württembergs). Saatgutmischungen mit diesem Namen haben die in der Tabelle 5 genannte Artenzusammensetzung und müssen Wildpflanzensaatgut aus den Ursprungsgebieten 11–13, 17 und 21 für die Variante „Süd“ und Wildpflanzensaatgut aus den Ursprungsgebieten 9–12 und 21 für die Variante „West“ enthalten. Die Varianten Frühsommer- und Spätsommernautsaat sind beide zulässig.
- Die mehrjährigen Mischungen „Lebendiger Acker frisch FAKT II E8“, „Lebendiger Acker trocken FAKT II E8“, „Lebendiger Waldrand frisch FAKT II E8“, „Lebendiger Waldrand trocken FAKT II E8“ und „Lebendiger Gewässerrand FAKT II E8“. Diese Mischungen müssen die Artenzusammensetzung der Tabelle 6 aufweisen. Sie dürfen aber nur Wildpflanzensaatgut aus den baden-württembergischen Ursprungsgebieten 9–13, 17 und 21 enthalten.
- Es gelten die FAKT II Blühmischungs-Qualitätsvorschriften (u. a. keinerlei Besatz mit *Cuscuta*-Arten; siehe Punkt IV).

Da die Mischungszusammensetzungen sich gegenüber FAKT 2022 nicht geändert haben, können die Mischungen 2023 auch noch unter dem Namen „FAKT E8“ statt „FAKT II E8“ vertrieben werden.

Sonderregelungen für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe

Für eine Spätsommernautsaat im Jahr 2022 für eine Förderung ab 2023 galt noch eine Sonderregelung, wonach konventionelles Saatgut verwendet werden durfte (Kontrollstellen wurden vom RP Karlsruhe informiert):

Für Aussaaten ab 2023 wird folgendes Verfahren für ökologisch wirtschaftende Betriebe umzusetzen sein:

- Die FAKT II E8 Blühmischungen werden aus zwei Mischungskomponenten selbst gemischt: erhältlich sind regionale Wildformenkomponenten für FAKT-II E8 (allgemeinverfügt) und öko-zertifizierte Kulturartenkomponenten für FAKT II E8 (vollständig bestehend aus Öko-Saatgut von Kulturformen). Es müssen die passenden, zusammengehörigen Komponenten gekauft werden.
- Vorgesehen sind die Mischungskomponenten für die Mischungen „Blühende Landschaft West/Süd, FAKT II E8“, jeweils Frühjahrs- und Spätsommernautsaat und „Lebendiger Acker trocken/frisch FAKT II E8“.
- Für die Wildartenkomponente muss regionales Saatgut aus baden-württembergischen Ursprungsgebieten verwendet werden (s. o., Regelungen wie für konventionelle Mischungen, Artenzusammensetzung mit Samengewichtsanteilen nach Tabelle A1 und A2 im Anhang). Hier liegt derzeit eine Allgemeinverfügung vor, d. h. wenn in der Datenbank oXs kein ökologisches gebietseigenes Saatgut für das Ursprungsgebiet, in dem das Saatgut verwendet werden soll, verfügbar ist und das Saatgut nach VWW-Regiosaat® bzw. RegioZert® zertifiziert ist, darf auch konventionelles Saatgut verwendet werden. Auf dem Lieferschein oder einem Anhang zum Lieferschein und auf dem Etikett müssen die Artenzusammensetzung mit den jeweiligen Gewichtsanteilen der Mischung und die Ursprungsgebiete des Wildpflanzensaatguts verzeichnet sein. Außerdem muss der Zusatz „Die Wildarten sind zertifiziert nach VWW Regiosaat® bzw. RegioZert® auf Etikett oder Lieferschein stehen. Dabei sind die oben genannten Ursprungsgebiete und (seitens der Saatgutfirmen) die Artenzusammensetzungen und Samengewichtsanteile der Tabellen A1 und A2 zu beachten. Lieferschein, Rechnung und Etikett sind für Kontrollen aufzubewahren. Im Namen der Mischung muss sowohl FAKT II E8 als auch die Mischungsbezeichnung vorkommen.
- Vom Verwender/ der Verwenderin muss vor der Aussaat über die Datenbank www.organicXseeds.de (oXs) geprüft werden, ob die in der Wildformen-Mischung enthaltenen Arten mit Herkunftsnachweis in ökologischer Qualität verfügbar sind. Auskünfte bzgl. der Nutzung der Datenbank (Eintragung der Saatgutmenge und Ausdruck der Belege) erteilt die jeweils zuständige Öko-Kontrollstelle.

TABELLE 5: ARTENZUSAMMENSETZUNG DER SAATGUTMISCHUNGEN „BLÜHENDE LANDSCHAFT MEHRJÄHRIG WEST FAKT II E8“ UND „BLÜHENDE LANDSCHAFT MEHRJÄHRIG SÜD FAKT II E8“, JEWEILS IN DER FRÜHJAHR- UND SPÄTSOMMERVARIANTE

Botanischer Name	Deutscher Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	BL mj. West Späts. FAKT II E8 Gew. %	BL mj. Süd Späts. FAKT II E8 Gew. %	BL mj. West Frühj. FAKT II E8 Gew. %	BL mj. Süd Frühj. FAKT II E8 Gew. %
<i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	K	4	4	6	6
<i>Camelina sativa</i>	Leindotter	K	3	3	2.9	2.9
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	K	5	5	2.9	2.9
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Buchweizen	K			9	9
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel	K	4	4		
<i>Helianthus annuus</i>	Sonnenblume	K			9	9
<i>Lepidium sativum</i>	Gartenkresse	K	3	3		
<i>Linum usitatissimum</i>	Öllein, Saatlein	K			8.7	8.7
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee	K	2	2	1.5	1.5
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne	K	2	2	2	2
<i>Petroselinum crispum</i>	Petersilie	K	3	3		
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Büschelschön	K			5	5
<i>Pisum sativum</i>	Wintererbse	K	12	12		
<i>Rucola selvatica</i>	Wilde Rauke	K	2	2		
<i>Sinapis alba</i>	Weißer Senf	K			2	2
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnatklee	K	7	7	6	6
<i>Vicia faba</i>	Winter-Ackerbohne	K	13	13		
<i>Vicia sativa</i>	Sommerwicke, Saatwicke	K			5	5
	Anteil Kulturformen (%)		60	60	60	60
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	W	0.8	1	0.8	1
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färberkamille	W	1	1	1	1
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	W		0.1		0.1
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	W	6	6.2	6	6.2
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesenflockenblume	W	0.7	1	0.7	1
<i>Cichorium intybus</i>	Gemeine Wegwarte	W	1.5	2	1.5	2
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	W	1.8	2	1.8	2
<i>Dianthus armeria</i>	Raue Nelke	W	0.4		0.4	
<i>Echium vulgare</i>	Gemeiner Natternkopf	W	1.5	1.5	1.5	1.5
<i>Hypericum perforatum</i>	Johanniskraut	W	0.3	0.5	0.3	0.5
<i>Isatis tinctoria</i>	Färberwaid	W	0.5	0.5	0.5	0.5
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	W	0.3	0.4	0.3	0.4
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	W	2	2.5	2	2.5
<i>Malva moschata</i>	Moschusmalve	W	0.4	0.4	0.4	0.4
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	W	2.5	2	2.5	2
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	W	0.5	0.5	0.5	0.5
<i>Melilotus officinalis</i>	Gelber Steinklee	W	1	0.5	1	0.5
<i>Oenothera biennis</i>	Nachtkerze	W	1.5		1.5	
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Esparsette	Handelssaatgut	3.3	3.3	3.3	3.3
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	W	0.2	0.2	0.2	0.2
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	W	2	1.7	2	1.7
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	W	0.7	1	0.7	1
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	W	1.9	2	1.9	2

TABELLE 5 (FORTSETZUNG)

Botanischer Name	Deutscher Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	BL mj. West Späts. FAKT II E8 Gew. %	BL mj. Süd Späts. FAKT II E8 Gew. %	BL mj. West Frühj. FAKT II E8 Gew. %	BL mj. Süd Frühj. FAKT II E8 Gew. %
<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut	W	0.5		0.5	
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Resede	W	0.2	0.2	0.2	0.2
<i>Reseda luteola</i>	Färberresede	W	0.3	0.3	0.3	0.3
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesensalbei	W	1	1.2	1	1.2
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknoyf	W	2	2	2	2
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	W	0.8	0.5	0.8	0.5
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	W	0.6	0.8	0.6	0.8
<i>Silene latifolia</i>	Weiße Lichtnelke	W	0.8	0.8	0.8	0.8
<i>Silene vulgaris</i>	Traubenkropf-Leimkraut	W	1.3	1.5	1.3	1.5
<i>Sinapis arvensis</i>	Ackersenf	W	1	1.3	1	1.3
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	W	0.1	0.1	0.1	0.1
<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze	W	0.3	0.5	0.3	0.5
<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze	W	0.3	0.5	0.3	0.5
Anteil Wildformen (%)			40	40	40	40

- Die Mischungszusammensetzung der Kulturformenkomponenten für die zugelassenen Mischungen sind den Tabellen A3 und A4 im Anhang zu entnehmen. Hier muss zu 100 % öko-zertifiziertes Saatgut der aufgeführten Arten enthalten sein.
- Beide Komponenten werden vor der Aussaat im Verhältnis 40 % (Wildformen) zu 60 % (Kulturformen) vermischt. Für beide Mischungskomponenten gelten, sowie für alle anderen FAKT II-Blühmischungen auch, die FAKT II-Blühmischungs- Qualitätsvorschriften (u. a. keinerlei Besatz mit *Cuscuta*-Arten; siehe Punkt IV).

3.5 Tipps zur Umsetzung

Für den Erfolg dieser Maßnahmen ist eine sorgfältige Aussaat und gründliche Saatbettvorbereitung essentiell. Das lohnt sich vor allem bei den empfindlichen mehrjährigen Mischungen.

- Standorte mit sehr hohem Unkrautdruck, insbesondere durch Wurzelunkräuter, sind ungeeignet oder benötigen eine sehr gründliche Bodenvorbereitung (Pflug/mehrmaliges Grubbern).
- Für den Erfolg und ein gutes Auflaufen von Blühmischungen sind optimale Aussaatbedingungen entscheidend. Vor allem besonders biodiversitätsfördernde Mischungen mit vielen heimischen Wildarten enthalten Feinsämereien und Lichtkeimer, die nur oberflächlich abgelegt und angewalzt werden sollten.

- Werden einjährige Blühmischungen immer wieder auf derselben Fläche ausgesät, verstärkt sich ggf. die Unkrautproblematik.
- Insbesondere bei einem hohen Druck von wärmeliebenden Samenunkräutern (wie z. B. Hirsen, Weißer Gänsefuß) ist eine Spätsommersaat erfolgsversprechender.
- Auch in sommertrockenen/heißten Gebieten und bei mehrjährigen Blühmischungen im Allgemeinen hat sich eine Spätsommersaat bewährt (vor zu erwartenden Herbstniederschlägen). Viele Wildarten keimen so früher und erfolgreicher.

BODENVORBEREITUNG

- Herstellung eines lockeren und feinkrümigen Saatbetts; optimal: mehrmaliges Grubbern der Fläche im Abstand von 10–14 Tagen.
- Nach der letzten flachen Bearbeitung den Boden vor der Aussaat absetzen lassen.
- Bei starkem Unkrautauflauf vor der Aussaat nochmals sehr flach bearbeiten (Kreiselegge). Dies dient auch der vorbeugenden Unkrautregulierung im Sinne eines falschen Saatbetts.

AUSSAAT

- Saatgut sorgfältig durchmischen.
- Oberflächliche Aussaat mit der Drillmaschine (Säschare/Striegel hochstellen; Rührwelle ausstellen, um Entmischung zu vermeiden).

TABELLE 6: ARTENZUSAMMENSETZUNG DER MEHRJÄHRIGEN MISCHUNGEN „LEBENDIGER ACKER TROCKEN FAKT II E8“ UND „LEBENDIGER WALDRAND TROCKEN FAKT II E8“, „LEBENDIGER WALDRAND FRISCH FAKT II E8“ UND „LEBENDIGER WALDRAND TROCKEN FAKT II E8“.

Falls Kamm- oder Ruchgras als Wildform nicht verfügbar sind, kann ersatzweise Rotschwingel (*Festuca rubra*) als Kulturform eingemischt werden.

Botanischer Name	Deutscher Name	Wild- (W)/ Kultur- form (K)	Leb. Acker tr. FAKT II E8 Gew. %	Leb. Acker frisch FAKT II E8 Gew. %	Waldrand frisch FAKT II E8 Gew. %	Waldrand trocken FAKT II E8 Gew. %	Leb. Ge- wässerrand FAKT II E8 Gew. %
<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesen-Fuchsschwanz	K					0.5
<i>Anethum graveolens</i>	Dill	K	3	3.5			
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>medullosa</i> Thell.	Markstammkohl	K			4	4	
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	K	2.5	3			
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Buchweizen	K	10	10	15.9	15.4	8
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesenschwingel	K					0.5
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel	K	2	2			
<i>Helianthus annuus</i>	Sonnenblume	K	10	13			11.5
<i>Lepidium sativum</i>	Gartenkresse	K					6
<i>Linum usitatissimum</i>	Öllein, Saatlein	K	14.8	15	16	14	14.5
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee	K		1.1	1.5	1.5	1
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne	K	4	3	1.8	1.8	
<i>Pisum sativum</i>	Wintererbse	K			9	9	
<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Büschelschön	K	5	5.5			7
<i>Raphanus sativus</i>	Ölrettich	K			2	2	
<i>Trifolium hybridum</i>	Schweden-Klee	K			2		4.7
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnatklee	K			6		
<i>Trifolium resupinatum</i>	Perserklee	K				5.2	5
<i>Vicia sativa</i>	Sommerwicke, Saatwicke	K	6.3	8.2	8.9	9.3	
Anteil Kulturformen (%)			57.6	64.3	67.1	62.2	58.7
<i>Achillea millefolium</i>	Gemeine Schafgarbe	W	1	1.2	2	1.5	2
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	W	0.5			0.8	
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz	W			0.3		0.5
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färberkamille	W	0.5			0.5	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Ruchgras	W			3	3	4.4
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesenkerbel	W		0.7			0.5
<i>Barbarea vulgaris</i>	Echte Winterkresse	W	1	1	1	1	0.7
<i>Betonica officinalis</i>	Heilziest	W					0.3
<i>Campanula trachelium</i>	Nesselblättrige Glockenblume	W			0.2		
<i>Carum carvi</i>	Wiesenkümmel	W	1.5	1.5	2		3
<i>Centaurea cyanus</i>	Kornblume	W	2	2	2	2	3.5
<i>Centaurea jacea</i>	Wiesenflockenblume	W	2	2	2.5	2.2	2
<i>Centaurea scabiosa</i>	Skabiosenflockenblume	W	0.2				
<i>Cichorium intybus</i>	Gemeine Wegwarte	W	2.9	3.2			
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	W	0.1				
<i>Crepis biennis</i>	Wiesenpippau	W		1.5	1		1.5
<i>Cynosurus cristatus</i> (W), u. U. <i>Festuca rubra</i> (K)/ <i>Anthoxanthum odoratum</i> (W)	Wiesen-Kammgras/ Rotschwingel/Ruchgras	W/K	2.1	3	3	3	5
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	W	2	1.7	0.8	2	
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	W	0.2	0.2			
<i>Echium vulgare</i>	Gemeiner Natternkopf	W	1	1			

TABELLE 6 (FORTSETZUNG)

Botanischer Name	Deutscher Name	Wild- (W)/ Kultur- form (K)	Leb. Acker tr. FAKT II E8 Gew. %	Leb. Acker frisch FAKT II E8 Gew. %	Waldrand frisch FAKT II E8 Gew. %	Waldrand trocken FAKT II E8 Gew. %	Leb. Ge- wässerrand FAKT II E8 Gew. %
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Gewöhnlicher Wasserdost	W					0.1
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	W					0.5
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	W	1.3	1.5	3		2.5
<i>Galium verum</i>	Echtes Labkraut	W	0.8			0.9	
<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesen-Bärenklau	W		0.2	0.5		0.7
<i>Hypericum perforatum</i>	Johanniskraut	W	0.3			0.5	
<i>Isatis tinctoria</i>	Färberwaid	W	0.1				
<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	W		0.3	0.3	0.2	0.3
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite	W	1	1.5	1.3	1.5	1.8
<i>Linaria vulgaris</i>	Gemeines Leinkraut	W	0.1		0.5		
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	W		0.5	0.8		0.7
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweide- rich	W			0.1		0.1
<i>Lythrum salicaria</i>	Gewöhnlicher Blutweide- rich	W		0.4	0.4		0.2
<i>Malva moschata</i>	Moschusmalve	W	0.6			1	
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	W		0.6	1		
<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee	W		2			
<i>Melilotus officinalis</i>	Gelber Steinklee	W	2				1.5
<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette	Handels- saatgut	6.3			6	
<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost	W	0.2			0.2	
<i>Papaver rhoeas</i>	Klatschmohn	W	2	2		2	3
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	W	1	1		0.9	1
<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernelle	W		0.3			0.2
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitz-Wegerich	W	2.4	2.2	3.3	3.3	2.5
<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	W	0.3			0.3	
<i>Prunella vulgaris</i>	Gemeine Braunelle	W	0.2	0.3			0.2
<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Resede	W				0.1	
<i>Reseda luteola</i>	Färberresede	W	0.3				
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	W					0.2
<i>Salvia pratensis</i>	Wiesensalbei	W	0.9			1	
<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	W	2		2	2	
<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut	W			0.3	0.4	
<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke	W		0.8	1.5		1.2
<i>Silene latifolia</i>	Weißer Lichtnelke	W	0.8			1.1	
<i>Silene vulgaris</i>	Traubenkropf-Leimkraut	W	1.5	2			1.2
<i>Sinapis arvensis</i>	Acker-Senf	W		1			
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte Goldrute	W	1.1			0.2	
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	W		0.1	0.1		
<i>Verbascum lychnitis</i> ; u.U. <i>Verbascum nigrum</i>	Mehlige Königskerze u.U. schwarze Königskerze	W	0.2			0.2	
Anteil Wildformen (%)			42.4	35.7	32.9	37.8	41.3

- Eine Aussaat mit Schleuderstreuer ist wegen der Gefahr der Entmischung und des erhöhten Risikos eines mangelhaften Auflaufens nicht empfehlenswert.
- Nach Aussaat anwalzen/rückverfestigen, damit Bodenkontakt hergestellt wird. Ein guter Bodenkontakt ist für das Auflaufen der Saat extrem wichtig.
- Keimlinge benötigen drei Wochen ausreichend Feuchtigkeit; Trockenphasen meiden.

AUSSAATSTÄRKE

- Für die Blühflächen im Rahmen der Öko-Regelung 1b Angaben der Saatguthersteller beachten, i. d. R. mind. 15 kg/ha; bei voraussichtlich starker Unkrautkonkurrenz mit Sommerunkräutern wie Weißem Gänsefuß, Hirse oder Franzosenkraut Saatstärke ggf. erhöhen.
- Für Maßnahme E7 Aussaatstärke von M3(+) ca. 10 kg/ha, die in den Folgejahren bei stärkerem Unkrautdruck aber erhöht werden kann.
- Für Maßnahme E8 8–10 kg (wobei auch hier bei größerem Unkrautdruck die Aussaatstärke höher sein sollte)
- Bewährt hat sich das Strecken mit Füllmaterial (z. B. Sojaschrot) im Verhältnis 1:4, um eine gleichmäßige Verteilung des Saatguts zu gewährleisten.

PFLEGE

Besonders bei den mehrjährigen Blühmischungen kann die Verunkrautung aufgrund des unregelmäßigen und langsamen Auflaufens der Wildformen im ersten Jahr sehr hoch sein. Hier kann für FAKT II E8 die ULB hinzugezogen und nach Genehmigung ein Schröpschnitt gemacht werden. Ein solcher wird ca. 6–8 Wochen nach der Aussaat (Bestand kniehoch) auf 10–20 cm Höhe gemacht, um das Aussamen der Unkräuter zu verhindern. Oft sehen die Flächen ab dem zweiten Standjahr ohne weiteres Eingreifen gut aus (auch ohne Schröpschnitt), so dass von einem zu frühen Umbruch abgeraten wird, der die Probleme oft noch verstärken kann.

Blühflächen als Ökoregelung 1b müssen spätestens nach 2 Jahren (bei entsprechender Mischung) neu ausgesät werden.

Generell ist bei der Pflege das Mulchen die insektenschädlichste Variante. Betriebe, die die Möglichkeit haben, zu mähen (möglichst ohne Aufbereiter) können hier viele Insekten und andere Kleintiere retten.




Abb. 5: Saatgutmischung

Foto: Jörg Jenrich/LTZ

4 Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II-Maßnahmen

Die für FAKT II genutzten Blühmischungen unterliegen strengen Qualitätsvorschriften, die seitens der Saatgutfirmen eingehalten werden müssen. Dazu gehört u. a.:

- Die Mischungen dürfen keinen Besatz an Rumex-Arten (außer *R. acetosella* und *R. acetosa*), Flughäfer, Taubem Hafer, Ackerfuchsschwanz, Kreuzkraut, Zackenschötchen, Riesenbärenklau, Ambrosia, Orobranche-Arten oder Seide aufweisen.
- Bei Ringelblume sind ausschließlich nichtgefüllte Sorten zu verwenden und bei der Sonnenblume Trachtsorten, die Pollen und Nektar spenden. Die Kornblume muss ungefüllt und blau sein. Auch darf in Blühmischungen für E7 und E8 nur der „Echte Buchweizen“ und kein „Tatarischer Buchweizen“ zugemischt werden.

Diese Qualitätsvorgaben sind für die überjährige Mischung M3 bzw. M3+, die mehrjährigen Mischungen der Maßnahmen E8, E14 und E15 und für die Untersaatenmischungen der Maßnahme E13.2 verbindlich. Die Vorgaben bezüglich Besatzfreiheit gelten auch für Zwischenfruchtmischungen im Rahmen von E1.2. Ein Hinweis, dass die Mischung für eine FAKT II-Förderung zulässig ist, muss auf Etikett, Rechnung und Lieferschein abgedruckt sein (z. B. „FAKT

II M3(+)" oder der Hinweis „zulässig für die FAKT II-Maßnahme E8" oder der Zusatz „Die Saatgutmischung entspricht hinsichtlich Arten und Mischungsanteilen den Anforderungen der FAKT II-Maßnahme E1.2 ‚Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau" ("). Bei den Zwischenfruchtmischungen muss zusätzlich noch die Tabelle aus dem Zwischenfruchtmischungsrechner für Landwirte verfügbar sein, mit den enthaltenen Arten, deren TKMs, deren Samengewichtsanteil und Gewichtsprozenten. Für die mehrjährigen Mischungen der Maßnahme E8 gelten die zusätzlichen Hinweise zur Regionalisierung und Zertifizierung, die oben beschrieben sind. Weitere Vorgaben für die Saatgutfirmen sind dem Dokument „Qualitätsanforderungen an das Saatgut für FAKT II-Mischungen" zu entnehmen.

5 FAKT-Maßnahme E9: Anbau von Mais mit Gemengepartnern (Stangenbohnen)

5.1 Zielsetzung

Durch die Stangenbohne wird besonders für Hummeln ein zusätzliches Nektarangebot geschaffen. Die filigranen Bohnenblüten werben die Maisbestände zudem auch optisch auf, was dem Landschaftsbild in ackerbaulich geprägten Regionen zu Gute kommt.

5.2 Was wird verlangt?

- Aussaat von fertigen Mais-Stangenbohnen-Mischungen. Zielbestandsdichte 120.000 Pflanzen pro ha.
- Die Anteile der beiden Mischungskomponenten müssen zwischen 60 und 70 % bei Mais und bei 30–40 % bei Stangenbohne liegen. Ab der Aussaat 2024 muss das Mischungsverhältnis in der Saatgutmischung 60 bis 67 % Mais und 33 bis 40 % Stangenbohnen betragen. Die Anpassung ist erforderlich aufgrund der Festlegungen im GAP-Strategieplan Deutschlands.
- Nachweis des Saatguteinkaufs über Lieferschein, Rechnung oder Etikett.

5.3 Tipps zur Umsetzung

- Standorte mit hohem Unkrautdruck oder Wassermangel meiden.

- Wenn die Silage verfüttert werden soll, sollten die Bohnen einen Grenzwert von 10 mg Phasin pro g Trockenmasse nicht überschreiten.
- Weitere Hinweise zum Mais-Stangenbohnen- und Mais-Gemenge-Anbau finden sich im Internet auf den Seiten des LTZ Augustenberg:
 - **Möglichkeiten und Herausforderungen des Silomais-Gemenge-Anbaus**
www.LTZ-Augustenberg.de >Service >Schriftenreihe >Augustenberger Beratungshilfen
 - **Mais-Stangenbohnen-Gemenge**
www.LTZ-Augustenberg.de >Service >Schriftenreihe >Hinweise zum Pflanzenbau

BODENVORBEREITUNG

- Saatbettbereitung praxisüblich für Mais.

AUSSAAT

- Aussaatzeitpunkt wie bei Mais üblich, die Bodentemperatur darf nicht unter 10 °C liegen. Keine Aussaat, wenn die Gefahr von Spätfrösten besteht.
- Bei der Saattiefe am Mais orientieren, generell sollte nicht tiefer als 5–6 cm gesät werden, da die optimale Saattiefe für Bohnen 2–3 cm beträgt.

DÜNGUNG

- Die Stickstoff-Düngung kann auf 50–75 % des N-Düngebedarfs nach Düngeverordnung für Silomais reduziert werden.

UNKRAUTREGULIERUNG

- Der chemisch-synthetische Pflanzenschutz muss im Voraufbau erfolgen (nicht später als 2–3 Tage nach der Saat). Bei der mechanischen Unkrautregulierung ist, wie in Maisbeständen, praxisübliches Striegeln und Hacken möglich. Ein Anhäufeln sollte erst beim letzten Hackgang erfolgen, wenn sich die Bohne schon etabliert hat.

FRUCHTFOLGE

Auf Grund der geringen Erfahrungen mit Mais-Stangenbohnen in der Fruchtfolge wird empfohlen, 3–5 Jahre vor dem Mais-Stangenbohnen-Anbau keine Leguminosen angebaut zu haben. Für die legumen Nachfrüchte sollte ebenfalls eine Anbaupause eingehalten werden, um einer möglichen „Leguminosenmüdigkeit" vorzubeugen.



Abb. 6: Lichtacker nach FAKT E13.1 mit Acker-Rittersporn, einem gefährdeten Ackerwildkraut
Foto: Juliane Langer/LTZ

6 FAKT II-Maßnahmen E13.1 „Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide (Lichtäcker)“ und E13.2 „Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide“

6.1 Zielsetzung

Mit weitem Reihenabstand gesätes Getreide bietet Platz für Ackerwildkräuter und bodenbrütende Feldvögel. Der Aufwuchs zwischen den Reihen liefert vielfältige Nahrung, u. a. für bestäubende Insekten, aber auch für andere Insekten und Vögel. Gerade im zeitigen Frühjahr und Sommer tun sich in der Agrarlandschaft sogenannte „Trachtlücken“ auf, die durch blühende Untersaaten oder Ackerwildkräuter geschlossen werden können. Die beiden vorgesehenen Maßnahmen helfen, den Herbizid-, Düngemittel- und Insektizideinsatz zu verringern. Die Etablierung von Untersaaten in der Maßnahme E13.2 kann nach der Ernte die Funktionen von Zwischenfruchtmischungen übernehmen, ohne eine erneute Bodenbearbeitung und Aussaat nötig zu machen und trägt durch die intensive und vielfältige Durchwurzelung zum Boden- und Wasserschutz bei.

6.2 Was wird verlangt?

- Einsaat von Winter- oder Sommergetreide mit einem Abstand der Drillreihen von 25 bis max. 45 cm. Es ist auch eine Aussaat des Getreides in Doppelreihen erlaubt (je zwei Säschare geöffnet, zwei geschlossen). Zwischen den Getreidedoppelreihen und der nächsten Getreidedoppelreihe muss der Getreidereihenabstand mindestens 30 cm und darf maximal 45 cm betragen.
- Herbizide und Insektizide sind ab Aussaat des Getreides unzulässig.
- Die Verwendung von insektiziden Beizmitteln ist nicht erlaubt.

Zusätzliche Anforderungen an die Maßnahme E13.2:

- Aussaat einer vorgegebenen Untersaatenmischung (s.u.).
- Keine mechanische Unkrautregulierung ab der Aussaat der Untersaat.
- Eine Nutzung der Untersaat ist nicht zulässig und ein Umbruch frühestens ab dem 1.9. möglich.

Mischungen

- Es müssen jeweils die vorgegebenen Mischungen für Sommer- bzw. Wintergetreide verwendet werden (Tabellen 7 und 8). Eigenmischungen sind nicht zulässig. Nachweis über Etikett, Lieferschein oder Rechnung.
- Grundsätzlich dürfen Arten aus der Mischung von den Saatgutfirmen durch die jeweils erlaubten Ersatzarten ausgetauscht werden, um Engpässen bei einzelnen Arten vorzubeugen.
- Es gelten die Qualitätsvorgaben für FAKT II Blüh- und Zwischenfruchtmischungen.

6.3 Sonderregelungen für Mischungen für ökologisch wirtschaftende Betriebe

Für Öko-Saatgutmischungen dürfen bis zu drei Arten der Mischungen weggelassen werden, um Öko-Betrieben eine Teilnahme an diesen Maßnahmen zu ermöglichen.

6.4 Tipps zur Umsetzung

- Die Maßnahme E13.1 (Lichtäcker) empfiehlt sich vor allem auf mageren Standorten oder Sonderstandorten, auf denen noch Restvorkommen gefährdeter oder besonderer Ackerwildkräuter zu finden oder in der Nähe sind (AZ <20; Kalkscherbenäcker, nasse Senken, Trockenkuppen etc.).

TABELLE 7: WINTERGETREIDEMISCHUNG, DIE FÜR FAKT II E13.2 IM WINTERGETREIDE VORGESCHRIEBEN IST.

Einzelne Arten können durch die jeweils angegebenen Ersatzarten ersetzt werden. W/K gibt an, ob die Kultur- oder Wildform genutzt werden muss.

Botanischer Name	Deutscher Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	Gew. %	Grundsätzlich erlaubte Ersatzarten
<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe	W	1	<i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume); <i>Crepis capillaris</i> (Kl. Pippau); <i>Hypochaeris spec.</i> (Ferkelkraut-Arten); <i>Hieracium spec.</i> (Habichtkräuter); <i>Scorzoneroide autumnalis</i> (Herbst-Löwenzahn); <i>Leontodon hispidus</i> (Rauer Löwenzahn)
<i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	K	3.5	
<i>Camelina sativa</i>	Leindotter	K	1	
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	K	5	
<i>Linum usitatissimum</i>	Lein	K	5	
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee	K	12	<i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee=Gelbklee	K	13.9	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee); <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
<i>Ornithopus sativus</i>	Serradella	K	8.5	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	W	3	
<i>Prunella vulgaris</i>	Gew. Braunelle	W	0.1	Familie <i>Lamiaceae</i> (Lippenblütler) (z.B. <i>Betonica officinalis</i> ; <i>Clinopodium vulgare</i>)
<i>Sanguisorba minor</i>	Kl. Wiesenknopf	W	1.5	<i>Pimpinella saxifraga</i> ; <i>Pimpinella major</i> (Kleine/Große Bibernelle)
<i>Trifolium hybridum</i>	Schwedenklee	K	3.5	
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnatklee	K	25	
<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee	K	7	
<i>Trifolium repens</i>	Weißklee	K	3	
<i>Trifolium subterraneum</i>	Erdklee	K	4	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee); <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
<i>Trigonella caerulea</i>	Schabzigerklee	K	1	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee); <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
<i>Valerianella locusta/olitoria</i>	Feldsalat	K	2	

TABELLE 8: SOMMERGETREIDEMISCHUNG, DIE FÜR FAKT II E13.2 IM SOMMERGETREIDE VORGESCHRIEBEN IST.

Einzelne Arten können durch die jeweils angegebenen Ersatzarten ersetzt werden.

Botanischer Name	Deutscher Name	Wild- (W)/ Kulturform (K)	Gew. %	Grundsätzlich erlaubte Ersatzarten
<i>Achillea millefolium</i>	Schafgarbe	W	0.2	<i>Knautia arvensis</i> (Acker-Witwenblume); <i>Hypochaeris spec.</i> (Ferkelkraut-Arten); <i>Hieracium spec.</i> (Habichtkräuter); <i>Scorzoneroide autumnalis</i> (Herbst-Löwenzahn); <i>Leontodon hispidus</i> (Rauer Löwenzahn)
<i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	K	4	
<i>Camelina sativa</i>	Leindotter	K	1	
<i>Coriandrum sativum</i>	Koriander	K	5	
<i>Lepidium sativum</i>	Kresse	K	5	
<i>Linum usitatissimum</i>	Lein	K	8	
<i>Lotus corniculatus</i>	Hornklee	K	9	<i>Anthyllis vulneraria</i> (Wundklee)
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfenklee = Gelbklee	K	12	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee); <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
<i>Ornithopus sativus</i>	Serradella	K	12	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	W	2.5	
<i>Trifolium hybridum</i>	Schwedenklee	K	3.5	
<i>Trifolium incarnatum</i>	Inkarnatklee	K	24.8	
<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee	K	6	
<i>Trifolium repens</i>	Weißklee	K	4	
<i>Trifolium subterraneum</i>	Erdklee	K	2	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee); <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)
<i>Trigonella caerulea</i>	Schabzigerklee	K	1	<i>Trifolium campestre</i> (Feldklee); <i>Trifolium dubium</i> (Fadenklee)

- Beide Maßnahmen empfehlen sich nicht auf sehr durch konkurrenzstarke Unkräuter oder Ungräser vorbelasteten Flächen (Disteln, Quecken, Kamille, Fuchsschwanz, Hirsen).
- Durch den hohen Leguminosenanteil der Untersaaten bei E13.2 sind Flächen mit Leguminosen als Vor- oder Nachfrucht nicht geeignet.
- Gründliche Vorbereitung des Saatbetts, evtl. mehrmalige flache Bearbeitung.
- Für E13.2 ist eine erfolgreiche Etablierung der Untersaat zentral für den Erfolg der Maßnahme und eine starke Unkrautunterdrückung. Sie sollte daher möglichst zeitgleich oder vor dem Getreide oberflächlich (Lichtkeimer!) ausgesät und angewalzt werden. Eine Aussaat mit Sämaschine oder Streuer ist möglich (Säschare/Striegel hochstellen), die Aussaatstärke sollte 10–12 kg/ha betragen. In Doppelreihen entwickelt sich die Untersaat ggf. besser, insbesondere wenn der doppelte Saatreihenabstand kleiner als 30 cm wäre. Bei Wintergetreide sollte sich die Untersaat bereits im Herbst etablieren können, daher wird von späten Aussaaten oder Aussaaten im Frühjahr abgeraten.
- Damit das Getreide nicht zu dicht wächst, kann/sollte dessen Aussaatstärke reduziert werden (70–80 %).
- Bodenbrütende Feldvögel werden von dem lichten Reihenabstand insbesondere in Maßnahme E13.1 angelockt. Daher ist eine mechanische Unkrautregulierung in FAKT II E13.1 während der Haupt-Brutzeit (April bis Juli) nicht empfehlenswert (in E13.2 generell nicht erlaubt). Herbizidanwendungen sind auf den Maßnahmenflächen ab Aussaat generell verboten.
- Um konkurrenzstarke Unkräuter nicht zu sehr zu fördern, ist eine reduzierte Stickstoffdüngung empfehlenswert (beispielsweise 80–90 % der NID-Empfehlung bei angepasster Ertragserwartung).




Abb. 7: Sommergerste in weiter Reihe mit Untersaatenmischung mit Blüten von Inkarnatklée, Lein und Koriander.

Foto: Dr. Julia Walter

7 FAKT II-Maßnahme E14 und E15: „Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen“ und „Extensive Biomassepflanzen: Streifenanbau aus mehrjährigen Biomassepflanzen und Wildpflanzenmischungen“

Beide Maßnahmen sind nur bis maximal 10 ha je Betrieb förderbar. Eine Futternutzung ist nicht zulässig.

7.1 Zielsetzung

Artenreiche Wildpflanzenmischungen können eine ökologische Alternative oder Ergänzung zum Mais darstellen, da sie zahlreichen Tierarten Nahrungs-, Überwinterungs- und Rückzugsmöglichkeiten bieten. Durch die lange Standzeit tragen sie zum Bodenschutz und Humusaufbau bei. Sie helfen, Pflanzenschutzmittel einzusparen und liefern auch in trockenen Jahren relativ hohe Erträge. Da die Mischungen

fünf Jahre stehen können, steigt die Rentabilität über die Jahre. Bei der Beurteilung von Erträgen ist zu beachten, dass die spezifischen Methanerträge (m^3 Methan je kg oTM) der Wildpflanzenmischungen deutlich geringer liegen im Vergleich zum Silomais. Erfahrungsgemäß kann von einem Wert von rund $0,360 \text{ m}^3$ Methan je kg oTM beim Silomais ausgegangen werden. Bei den Wildpflanzen ab dem zweiten Standjahr von rund $0,250 \text{ m}^3$ Methan je kg oTM (im ersten Jahr aufgrund der einjährigen Arten ebenfalls bei über 300 m^3 Methan je kg oTM). Damit liegt die spezifische Methanausbeute um rund 30 % geringer im Vergleich zum Mais. Da auch die Trockenmasseerträge i. d. R. sehr deutlich hinter den Maiserträgen zurückbleiben, liegen die Methanerträge je ha üblicherweise unter 50 % im Vergleich zum Silomais.

7.2 Was wird verlangt für E14?

- Ein- oder Übersaat einer mehrjährigen vorgegebenen Wildpflanzenmischung als Hauptkultur mit mindestens 20 Arten (Mischungen s. u.). Eigenmischungen sind von der Förderung ausgeschlossen. Nachweis des Einkaufes über Lieferschein, Rechnung oder Etikett.
- In den auf das Erstjahr folgenden Jahren muss eine Ernte des Aufwuchses erfolgen: mindestens eine Schnittnutzung pro Jahr frühestens ab 15. Juli. Im ersten Verpflichtungsjahr kann eine Nutzung ab 15. Juli erfolgen.
- Keine Pflege und Nutzung der Wildpflanzenfläche zwischen dem 15. September und 15. März.
- Keine Herstdüngung.
- Auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist mit Ausnahme eines Herbizideinsatzes zur Etablierung der Wildpflanzenmischungen im Erstjahr zu verzichten.
- Der Aufwuchs darf nicht zur Futternutzung verwendet werden.
- Neuaussaat nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde möglich.
- Die Maßnahme ist im Verpflichtungszeitraum auf derselben Fläche zu erbringen.

7.3 Was wird verlangt für E15?

- Auf mindestens 10 % des Schlags erfolgt die Ein- oder Übersaat einer mehrjährigen, vorgegebenen Wildpflanzenmischung mit mindestens 20 Arten (Mischungen s. u.). Diese Mischung wird in Streifen von mindestens 6 m Breite ausgesät.

- Auf dem Rest des Schlags werden mehrjährige Biomassepflanzen angebaut: Topinambur, Brennnessel, Durchwachsende Silphie, Chinaschilf, Riesenweizengras, Rohrglanzgras oder Virginiamalve (*Sida hermaphrodita*). Deren Fläche darf 90 % des Schlags und eine Breite von 60 m nicht überschreiten.
- In den auf das Erstjahr folgenden Jahren muss eine Ernte des Aufwuchses erfolgen: mindestens eine Schnittnutzung der Wildpflanzenmischung pro Jahr frühestens ab 15. Juli.
- Keine Pflege und Nutzung der Wildpflanzenfläche zwischen dem 15. September und 15. März.
- Keine Herstdüngung der Wildpflanzenmischungen.
- Auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bei den Wildpflanzenmischungen ist mit Ausnahme eines Herbizideinsatzes zur Etablierung der Wildpflanzenmischungen im Erstjahr zu verzichten.
- Der Aufwuchs der Wildpflanzenmischung darf nicht zur Futternutzung verwendet werden.
- Neuansaat nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde möglich.

Mischungen für E14 und E15

Für die FAKT II-Maßnahmen E14 und E15 sind für die neue Förderperiode folgende Mischungen zulässig (Artenzusammensetzungen im Anhang Tabelle A5):

- Veitshöchheimer Hanfmix (verschiedene Anbieter)
- extensive Biomassepflanzen Mischung Öko (Semo Bio)
- Biogas BG 70 (verschiedene Anbieter)
- Biogas BG 90 (verschiedene Anbieter)
- Biogas BW (Rieger-Hofmann)
- Wildpflanzenmischung (Becker-Schoell)
- Biogas-Mischung Spätsommeransaat Süd 2023 (Rieger-Hofmann)
- Biogas-Mischung Frühjahrsansaat Süd 2024 (Rieger-Hofmann)

Eine Erweiterung um neue, von bisherigen Mischungen erheblich abweichende Mischungen kann formlos beim LTZ einmalig bis zum 31. Juli beantragt werden. Dabei sind Mischungsbezeichnungen zu wählen, die sich klar von bereits bestehenden Mischungen unterscheiden. Neu hinzukommende Mischungen werden anschließend im Rahmen einer Aktualisierung dieser Broschüre veröffentlicht. Diese Mischungen sind ab dem darauffolgenden Verpflichtungsjahr zur Aussaat zugelassen und werden in der Broschüre mit der entsprechenden Jahreszahl gekennzeichnet.



Abb. 8: Biogas-Mischung

Foto: Dr. Julia Walter/LTZ

7.4 Tipps zur Umsetzung

Zur Auswahl der Mischungen

- In den Mischungen variiert der Anteil „Massebildner“ (u. a. Hanf, Rainfarn, Eibisch, Beifuß, Alant...), z. T. sind stattdessen mehr kleinwüchsige Kräuter vorhanden (u. a. Buchweizen, Luzerne, Flockenblume, Rot-/Weißklee...). Entsprechend ist ein eher geringer ausfallender Methanertrag bei einem höheren Anteil kleinwüchsiger Kräuter zu erwarten.
- Teilweise sind nicht-heimische Wildarten enthalten, deren invasives Potential nach relativ kurzer Zeit nicht klar abzuschätzen ist (z. B. *Leonurus japonicus*, *Onopordon acanthium*, *Centaurea macrocephala*). Insgesamt ist eine starke Ausbreitung und Invasivität dieser Arten eher unwahrscheinlich, da die Arten teils bereits in Deutschland vorhanden sind oder bislang keine stark vegetative Vermehrung gezeigt haben.
- Hanf: Die Bundesopiumstelle verzichtet auf die Notwendigkeit einer Erlaubniserteilung, wenn der Anbau der Mischungen gemäß den Vorgaben von BLE möglich ist. Um der BLE die geforderten Kontrollen gem. Art. 30 Buchst. g der Verordnung (EU) Nr. 809/2014 zu ermöglichen, ist allerdings zu beachten, dass im verwendeten Saatgut nur EINE Hanfsorte (aus dem EU-Sortenkatalog, zugänglich über BLE /z. B. Sorte „Santhica“ oder „USO 31“) verwendet wird; eine Mischung mit mehreren Nutzhanfsorten ist nicht zulässig. Zudem müssen alle Meldungen erfolgen, die auch beim reinen Hanfanbau

der BLE vorzulegen wären (Aussaatflächenerklärung, Meldung über Blühbeginn des Hanfes, Anbauanzeige). Alle neuen Regelungen sowie Formulare für das betreffende Anbaujahr finden Sie jeweils ab Mitte Januar auf der Internetseite der BLE: www.ble.de >Themen >Landwirtschaft >Nutzhanf.

- Sudangras: Selbst die im Mai gesäten Pflanzen bleiben in der Regel bis Ende Juni frostempfindlich.
- Die Große Klette kann in Siedlungsnähe zu Problemen mit Tierbesitzern führen, da sie sich aus Hunde- bzw. Katzenfell nur sehr schwer wieder entfernen lässt, obwohl sie ansonsten faunistisch von großem Wert ist.
- Weichschalige Samen werden i. d. R. bereits durch die Silierung inaktiviert. Einige hartschalige Samen werden erst durch längere Gärung (z. B. Rosenmalve) oder fast gar nicht inaktiviert (z. B. Steinklee). Dadurch ist in der Folge eine Verschleppung möglich.

Aussaat

Für die Aussaat der Wildpflanzenmischungen gelten dieselben Tipps wie für Blühflächen, nur dass überwiegend eine Frühjahrsaussaat erfolgen sollte (Ende April bis Mai, mit Ausnahme der Mischungen, die für eine Spätsommer-/Herbstaussaat konzipiert sind). Es kann auch eine Aussaat im Spätsommer des Vorjahres anerkannt werden (dabei müssen zugelassene Mischungen verwendet werden, die jeweiligen Fördervoraussetzungen/Auflagen müssen zudem eingehalten werden). Auch hier besonders wichtig: nur oberflächlich ablegen und anwalzen.

Ernte

- Die Ernte empfiehlt sich Ende Juli/Anfang August (bei Ernte im ersten Jahr Anfang September) und sollte durchgeführt werden bevor die Pflanzen verholzen. Bei der Konservierung ist zu beachten, dass i. d. R. im Erntegut sehr wenig Zucker vorhanden ist, die Konservierungsbedingungen daher eher ungünstig sind. Deshalb ist darauf zu achten, dass der Trockenmassegehalt bei der Ernte zwischen 30 und 40 % liegt. Unter Beachtung der gängigen Silierregeln, kann dann dennoch eine verlustarme Konservierung gelingen, die Gefahr von Fehlgärungen ist aber erhöht. Idealerweise wird das Material deshalb mit anderen, gut silierbaren Substraten gemeinsam einsiliert.
- Da sich viele Wildtiere (Rehe, Feldhasen) in den Flächen verstecken, bei der Ernte langsam fahren und Fluchtmöglichkeiten lassen.
- Eine Staffelnutzung mit 2 bis 4 Wochen Abstand und einem Flächenverhältnis von 1/3 bis 2/3 (bezogen auf die Einzelfläche) wird empfohlen, damit stets Rückzugsräume vorhanden sind.
- Um einen zügigen Aufwuchs mit Nachblüte zu gewährleisten und um Verunkrautung vorzubeugen, sollte auf mindestens 20 cm Höhe gehäckselt werden. Dies ist ohne Ertragseinbußen möglich.

Düngung

Im ersten Jahr max. 90 kg N/ha nötig, ab dem 2. Standjahr max. 100 kg N/ha

8 FAKT II-Maßnahme F3: Precision Farming (teilflächenspezifische N-Düngung)

Precision Farming steht u. a. für eine teilflächenspezifische Mineraldüngung mit Hilfe von Satelliten-, Sensor- und Drohnensystemen. Precision Farming berücksichtigt die Heterogenität des Bodens und des Pflanzenbestandes auf einer Bewirtschaftungseinheit und kann damit zu einer weiteren Optimierung des umweltgerechten und ressourcenschonenden Pflanzenbaus beitragen.

8.1 Zielsetzung

Ziel der Maßnahme ist der Schutz und die Verbesserung des Zustandes der Grundwasserkörper, indem der Eintrag von

Nitrat ins Grundwasser reduziert wird. Durch die Berücksichtigung von Bodenunterschieden und der Ertragsfähigkeit innerhalb eines Feldes kann die N-Düngung gezielter gestaltet werden. Damit wird sowohl ein effizienterer Einsatz der Düngemittel als auch eine gewässerschonende Bewirtschaftung gewährleistet.

8.2 Was wird verlangt?

- Teilflächenspezifische Stickstoffdüngung von Getreide (einschließlich Mais), Raps und Kartoffeln anhand von Ertrags-, Boden-, Satelliten- oder Drohnenkarten. Ausschließlich in Winterungen ist alternativ die Verwendung eines Pflanzensensors zur Abschätzung des Stickstoffstatus (mit oder ohne Map Overlay) förderfähig.
- Nachweis der Durchführung erfolgt grundsätzlich mit digitalen Karten und elektronischer Dokumentation über Eigenmechanisierung oder Lohnunternehmen/Maschinenring/Dienstleister.
- Düngebedarfsermittlung nach Vorgaben der Düngeverordnung (N-Obergrenze).
- Sofern Aufzeichnungspflichten nach § 7 Abs. 2 SchALVO bestehen, kann die Maßnahme auf diesen Flächen (Teilflächen) nicht gewährt werden (Nitrat-Problemgebiete und Nitrat-Sanierungsgebiete, die den Überwachungswert überschreiten).
- Förderfähig sind bis zu 150 ha pro Betrieb.
- Vorlage der Ausdrucke der Ausbringkarten und Applikationskarten, auf deren Grundlage die Ausbringung erfolgte (Ertrags-/Boden-/Satelliten-/Drohnenkarten) von mind. 5 Prozent der beantragten Schläge (wobei jede beantragte Kultur zu berücksichtigen ist) nach Ablauf des Antragsjahres bei der unteren Landwirtschaftsbehörde.
- Es müssen für alle beantragten Kulturen die Ausbringungskarten im Betrieb für Prüfungen zur Verfügung stehen.

8.3 Umsetzung der Ziele

Applikationskarten für eine teilflächenspezifische N-Düngung können mit verschiedenen Werkzeugen erzeugt werden. Grundlage ist immer eine digitale Karte, die die Differenzierungen innerhalb eines Schlages aufzeigt. Dies können Ertragspotentialkarten aus mehrjährigen Satellitendaten sein oder der aktuelle Zustand einer Fläche aus aktuellen Satellitendaten. Analog dazu können diese




Abb. 9: Zonierung nach Ertragspotenzial aus Sentinel-2 NDVI-Daten (links) und UAS-Daten von Winterweizen dargestellt als RGB- (Mitte) und NDVI-Bild (rechts) vom 14.06.2022.

Abbildungen: Robin Maier/LTZ

Karten auch aus Drohnenaufnahmen erzeugt werden. Eine Basis kann auch eine mehrjährige Ertragskartierung durch die Erntetechnik sein. Online-Verfahren, wie der Einsatz optischer Sensoren, erzeugen eine solche Karte während der Ausbringung.

Förderfähig sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen.

AKTUELLE ODER MEHRJÄHRIGE SATELLITENDATEN

Aktuelle Satellitendaten

Aktuelle Satellitendaten wie die der Sentinel-2-Mission, für die es mittlerweile zahlreiche kommerzielle Anbieter gibt, die den Anwender von der Auswahl von Satellitenszenen für seine Region bis zur fertigen Applikationskarte führen. Liegen diese Daten zeitnah vor der Düngungsmaßnahme vor, können sie als Basis für eine teilflächenspezifische Düngung verwendet werden, da die aktuelle Differenzierung der Fläche berücksichtigt wird. Je älter aber die Daten sind, desto weniger stimmen sie mit der aktuellen Realität überein. In Zeiten andauernder Bewölkung kann es sein, dass wochenlang keine verwertbare Szene vorliegt. Deswegen dürfen keine Daten verwendet werden, die älter als drei Wochen sind. Falls für diesen Zeitraum keine Daten vorliegen, müssen die nachfolgend beschriebenen Verfahren verwendet werden.

Ertragspotentialkarten auf der Basis von mehrjährigen Satellitendaten

Auch hier gibt es mittlerweile zahlreiche Anbieter, die fertige Karten liefern oder dem Anwender ermöglichen, diese selbst durch die Auswahl von Zeiträumen, Kulturen u. ä. zu erstellen. In diesem Fall kommt es wesentlich darauf an, eine fundierte Entscheidung zur Auswahl der Daten zu

treffen, die für eine Berechnung geeignet sind, da diese zu sehr unterschiedlichen Zonierungen führen können. Eine unsachgemäße Auswahl kann kontraproduktiv wirken. Es sind Daten aus mindestens zwei Jahren zu prüfen und zur Dokumentation vorzulegen.

Direkte Verarbeitung von Sentinel 2-Szenen

Die Sentinel-Daten stehen zur freien Verfügung. Durch den Einsatz von (Open-Source-)GIS-Programmen können Zonierungen vorgenommen und Applikationskarten erzeugt werden. Dazu gibt es mittlerweile diverse Anleitungen. Diese Lösung kann für den Anwender kostenfrei sein, setzt aber ein hohes Maß an Know-How voraus. Die Nachteile sind die gleichen wie bei der kommerziellen Nutzung von Sentinel 2-Daten. Um die notwendige Datenqualität zu gewährleisten, dürfen nur atmosphärenkorrigierte Szenen des Levels 2 verwendet werden. Bei der Nutzung aktueller Sentinel 2-Szenen ist darauf zu achten, dass die Aufnahmen nicht älter als drei Wochen sind. Bei der Nutzung von historischen Sentinel-Daten müssen diese aus mindestens zwei Kalenderjahren geprüft werden. Bei der Verwendung von Daten aus den Vorjahren empfiehlt sich die Nutzung von Daten mit ähnlichen Kulturen z. B. aus der Abreifephase.

DROHNENDATEN

Die Verwendung von Drohnen (Unmanned Aerial Systems (UAS)) mit einer Multispektralkamera (mit mindestens einem Kanal im Nahinfrarotbereich) ermöglicht die Ermittlung von Vegetationsindizes, aus denen Zonierungen und Applikationskarten abgeleitet werden können, ähnlich wie bei Satellitendaten und Pflanzensensoren. Eine Befliegung kann zeitnah und wolkenunabhängig mit hoher Auflösung und ganzflächig erfolgen. Die Prozessierung von Drohnendaten ist allerdings zeitaufwändig, speicher- sowie rechenintensiv und erfordert ein hohes Maß an Know-How.

ERTRAGSKARTEN AUFGRUND VON ERTRAGSKARTIERUNGEN

Ertragskartierungen durch die Erntetechnik sollten über mehrere Jahre lang durchgeführt werden, um Unterschiede im Ertragspotenzial innerhalb der Flächen unter verschiedenen Umweltbedingungen zu identifizieren. Es müssen konsolidierte Ertragsdaten für die Erstellung einer Ertragspotenzialkarte verwendet werden: typischerweise sind Nachverarbeitungsschritte wie Filterung und Interpolation nötig um einer Ertragspotentialkarte zu erstellen. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Ertragsfähigkeit des Schläges direkt, und nicht über indirekte Parameter erfasst wird.

ONLINE-VERFAHREN MIT PFLANZENSSENSOR

Stickstoffsensoren ermöglichen eine direkte Messung des Pflanzenzustandes im Feld und bilden spezifische Indizes, die eine lokale Abschätzung der Stickstoffversorgung im Bestand erlauben. Daraus abgeleitete, variierende Düngemengen können im Online-Verfahren direkt zur Steuerung der Applikation verwendet werden. Ein sogenanntes Map-Overlay-Verfahren, also die Kombination von Sensor und digitaler Karte, ist möglich. Dieses Verfahren ist nur bei Winterungen förderfähig (Anwendung kann in Sommerungen im Einzelfall pflanzenbaulich sinnvoll sein, dann ohne Förderung).

8.4 Weitere Vorgaben

- Mindestens 60 % des nach Düngbedarfsermittlung ermittelten N-Düngedarfs sind teilflächenspezifisch auszubringen.
- Die Düngung mit Wirtschaftsdünger ist möglich, es ist der anrechenbare Stickstoff gemäß Düngeverordnung zugrunde zu legen. Die Ausbringung von Wirtschaftsdünger kann im Rahmen von F3 allerdings nicht als teilflächenspezifische Düngung anerkannt werden. D.h. maximal 40 % des nach Düngbedarfsermittlung ermittelten N-Düngedarfs kann in Form von Wirtschaftsdüngern ausgebracht werden.
- Der Einsatz von stabilisierten N-Düngerformen ist für alle Verfahren zulässig.
- Cultan-Depotdüngungsverfahren sind zulässig. Darunter fallen aber keine Wirtschaftsdünger (siehe oben).
- Unter Applikationskarten sind solche Karten zu verstehen, in denen die SOLL-Mengen für die N-Gaben in den Ertragszonen festgelegt sind. Sie steuern den Düngestreuer. Die Karte wird im Vorfeld der Düngung

(offline-Verfahren) erstellt und auf das Schlepper-Terminal übertragen. Ausbringungskarten dokumentieren den IST-Zustand – also die vom Terminal/System tatsächlich an den Düngestreuer übertragene Menge an Düngemittel. Diese sind in der Regel in der Auftragsdokumentation enthalten. Im Idealfall sind die beiden Karten annähernd identisch.

- Für alle Verfahren wird empfohlen, dass die Düngedarfsermittlung gemäß N-Empfehlungswert nach NID berechnet wird.

8.5 Dokumentation

Als Nachweis der Durchführung sind die N-Düngedarfsermittlung sowie die digital erfassten Ausbringungs- und Applikationskarten (aus Bodenkarten, Ertrags-, Satelliten- oder Drohnendaten), auf deren Grundlage die Ausbringung erfolgte, erforderlich. Bei Online-Verfahren (sensorbasierte Düngung) werden technisch nur Ausbringungskarten erzeugt.

Eine Applikationskarte enthält neben der Karte Informationen zur Datengrundlage. Das sind die Art und Herkunft der Daten, die verwendete Software zur Erstellung, Datum bzw. Zeitraum der Aufnahmen.

Ausbringungskarten enthalten zusätzlich zur Karte den Schlagnamen oder die Schlagnummer, Schlagumriss, Schlaggröße, Fruchtart, Datum der Maßnahme, die durchschnittliche Ausbringungsmenge in kg N/ha Reinnährstoff sowie eine Legende oder Histogramm, aus dem ersichtlich ist, welche N-Mengen auf welchen Teilflächen des Schläges ausgebracht wurde.

Nach Abschluss des aktuellen Förderjahres müssen zur Bewilligung die oben genannten Nachweise von mind. 5 Prozent der beantragten Schläge (wobei jede beantragte Kultur zu berücksichtigen ist) durch den Antragstellenden bei der unteren Landwirtschaftsbehörde vorgelegt werden. Für alle beantragten Flächen müssen die Ausbringungskarten im Betrieb für Prüfungen zur Verfügung stehen. Eine digitale Dokumentation des erfassten Maschineneinsatzes erfolgt grundsätzlich durch die Speicherung elektronischer Dokumente, die ohne vorherige Bearbeitung sofort gedruckt oder per E-Mail versendet werden können.



Abb. 11: Mais in Strip-Till-Verfahren

Foto: Jörg Jenrich/LTZ

9 FAKT II-Maßnahme F4: reduzierte Bodenbearbeitung mit Strip-Till-Verfahren

Beim Strip-Till-Verfahren (Streifenbearbeitung) wird die Grundbodenbearbeitung nicht ganzflächig durchgeführt. Der Boden wird z. B. nach Getreide oder nach einer Zwischenfrucht nur im Bereich der zukünftigen Saat- bzw. Pflanzreihe gelockert, wodurch mindestens die Hälfte der Fläche unbearbeitet bleibt. Diese Streifen werden entweder durch „Streifenziehen“ mit gleichzeitiger Einsaat (als nicht-absätziges Verfahren in die Stoppel mit Strohauflege, danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zulässig) oder durch Streifenziehen (im Herbst des Vorjahres oder im Frühjahr in die Stoppel mit Strohauflege oder Zwischenfrucht, danach keine weitere Grundbodenbearbeitung zulässig) mit absätziger Einsaat der Kultur und GPS-Unterstützung angelegt. Zur Aussaat oder zum Pflanzen ist die Bestellung in den bearbeiteten Reihen in feinkrümeligem Boden möglich.

9.1 Zielsetzung

Das Strip-Till-Verfahren erhöht den Erosionsschutz durch ganzjährige Bodenbedeckung auf einem Teil der Fläche. Die Maßnahme Strip-Till kann mit der FAKT II-Maßnahme E1.2 (Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau) kombiniert werden. Zusammen mit den Begrünungsmaßnahmen wird das Risiko des Abtrags von fruchtbarem Ackerboden

deutlich verringert und damit auch der mögliche Eintrag von Bodenteilchen, Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in die Oberflächengewässer reduziert. Zusätzlich erhöht dieses Verfahren die Tragfähigkeit der Böden. Die teilweise Bedeckung der nicht bearbeiteten Streifen reduziert die Wasserverdunstung und erhöht die Wasserinfiltration in den Boden.

9.2 Was wird verlangt?

- Förderfähig sind nur Flächen, auf denen die Kulturen Zuckerrüben, Mais, Soja, Raps, Sonnenblumen, Sorghumhirse oder Feldgemüse angebaut werden.
- Im Antragsjahr streifenförmiges Säen oder Pflanzen der Hauptfrucht mit Hilfe von Strip-Till-Technik. Es müssen mindestens 50 % der Bodenoberfläche unbearbeitet bleiben. Der Reihenabstand beträgt mindestens 35 cm. Das Ziehen der Streifen und die Aussaat werden in einem Arbeitsgang oder absätzig durchgeführt.
- Durchführung und Nachweis der Maßnahme über Eigenmechanisierung oder Lohnunternehmen/Maschinenring/Dienstleister.
- Pflanzenreste der Vor- und Zwischenkulturen sind als Mulch auf der Bodenoberfläche oder zwischen den bearbeiteten Streifen zu belassen.
- Eine flache mechanische Stoppelbearbeitung vor dem Ziehen der Streifen ist grundsätzlich möglich, sofern auf der Bodenoberfläche ausreichend organische Erntestereste verbleiben.

9.3 Tipps zur Umsetzung

BODENBEARBEITUNG UND AUSSAAT

Die Streifen werden im Herbst des Vorjahres oder im Frühjahr direkt in die Erntereste der Vorfrucht oder in den Zwischenfruchtbestand gezogen. Das Stroh der Getreidevorfrucht ist auf der Fläche zu belassen. Vor dem Hintergrund der erforderlichen Reduzierung des PSM-Einsatzes ist eine flache mechanische Stoppelbearbeitung vor dem Streifenziehen im Rahmen der Maßnahme FAKT II F4 grundsätzlich möglich. Allerdings muss sichergestellt werden, dass an der Bodenoberfläche ausreichend organische Erntereste verbleiben. Eine wendende Bodenbearbeitung ist nicht möglich. Nach dem Ziehen der Streifen darf keine weitere flächige Grundbodenbearbeitung mehr erfolgen. Eine flache Stoppelbearbeitung empfiehlt sich insbesondere, wenn Fahrspuren vorliegen, Stroh ungleichmäßig auf der Fläche verteilt ist, oder wenn Zwischenfrüchte angebaut werden sollen und keine Direktsaattechnik zur Einsaat in die Stoppel vorhanden ist. Nach dem Ziehen der Streifen darf keine weitere flächige Grundbodenbearbeitung mehr erfolgen. Generell kann sich der Termin des Streifenziehens am ortsüblichen Termin für die Grundbodenbearbeitung orientieren. Die Saatbettbereitung in den Streifen kann mit der Aussaat kombiniert werden, wenn die Standortverhältnisse zum Zeitpunkt der Aussaat das zulassen.

Um die Streifen zur Saatbettbereitung oder Aussaat exakt zu treffen, ist der Einsatz von Geoinformationssystemen erforderlich. Dazu müssen die eingesetzten Maschinen über ein automatisches Lenksystem mit RTK-GPS-Genauigkeit verfügen. Nicht nur für die Aussaat von Ackerkulturen, sondern auch für die Pflanzung im Gemüsebau sind geeignete Maschinen verfügbar.

FRUCHTFOLGE

Erfolgreiche Erfahrungen mit Strip-Till-Systemen liegen für den Anbau von Zuckerrüben, Mais, Soja und Feldgemüse, insbesondere für Kopfkohl, vor. Getreide eignet sich sehr gut als Vorfrucht für den Anbau von Sommerungen im Strip-Till-Verfahren. Sehr gut passt auch der Zwischenfruchtanbau in Fruchtfolgen mit Strip-Till-Kulturen.

DÜNGUNG UND PFLANZENSCHUTZ

Die Düngung kann als Kopfdüngung ausgebracht werden. Da ein flächiges Einarbeiten bei der Streifenbearbeitung nicht möglich ist, kann die Wirkung deutlich verzögert sein. Daher sollte auch das Düngesystem auf streifenförmige


Applikation umgestellt werden. Häufig wird das Strip-Till-Verfahren auch mit Unterflurdüngung in den Streifen kombiniert. Das kann mit mineralischen oder organischen Düngemitteln erfolgen.

Da mindestens die Hälfte der Bodenoberfläche nicht bearbeitet wird, empfiehlt es sich, Ausfallgetreide und Unkräuter rechtzeitig nach den üblichen Regeln zu regulieren. Die Wirkung von Bodenherbiziden ist durch die Mulchauflage zwischen den Reihen unter Umständen verringert, daher sind Wirkstoffe mit zusätzlicher Blattwirkung zu empfehlen. Ebenfalls ist mit erhöhtem Befallsdruck durch Mäuse und Schnecken zu rechnen. Daher müssen die Flächen regelmäßig kontrolliert werden, um gegebenenfalls rechtzeitig reagieren zu können. Jeder Betrieb, der ein solches Verfahren anwenden will, sollte sich im Vorfeld intensiv mit den technischen und ackerbaulichen Voraussetzungen beschäftigen und dann möglichst alle geeigneten Feldfrüchte der Fruchtfolge im Strip-Till-Verfahren bestellen.

10 Literatur

- Abdalla, M. et al. (2019) A critical review of the impacts of cover crops on nitrogen leaching, net greenhouse gas balance and crop productivity. *GlobChangBiol* 25: 2530-2543.
- Albrecht, M. et al. The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination services and crop yield: a quantitative synthesis. *Ecology letters* 23, 1488–1498; 10.1111/ele.13576 (2020)
- Prasse, R., Kunzmann, D., Schröder, R. (2010) Entwicklung und praktische Umsetzung naturschutzfachlicher Mindestanforderungen an einen Herkunftsnachweis für gebietseigenes Wildpflanzensaatgut krautiger Pflanzen. DBU-Abschlussbericht 23931. <https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-23931.pdf>, 13.11.2019.

Anhang 1: Ursprungsgebiete für Regiosaatgut



Ursprungsregionen (Herkunftsgebiete) basierend auf Prasse, R., Kunzmann, D. & R. Schröder (2010);
grafische Umsetzung: D. Kunzmann

URSPRUNGSGBIETE

- | | |
|---|--|
| 1 Nordwestdeutsches Tiefland | 12 Fränkisches Hügelland |
| 2 Westdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland | 13 Schwäbische Alb |
| 3 Nordostdeutsches Tiefland | 14 Fränkische Alb |
| 4 Ostdeutsches Tiefland | 15 Thüringer Wald, Fichtelgebirge, Vogtland |
| 5 Mitteldeutsches Tief- und Hügelland | 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion |
| 6 Oberes Weser- und Leinebergland mit Harz | 17 Südliches Alpenvorland |
| 7 Rheinisches Bergland | 18 Nördliche Kalkalpen |
| 8 Erz- und Elbsandsteingebirge | 19 Bayerischer und Oberpfälzer Wald |
| 9 Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland | 20 Sächsisches Löß- und Hügelland |
| 10 Schwarzwald | 21 Hessisches Bergland |
| 11 Südwestdeutsches Bergland | 22 Uckermark mit Odertal |

Ursprungsgebiete (UG), die ganz oder teilweise in Baden-Württemberg liegen und daher für FAKT E8 zulässig sind: UG 9 (Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland), UG 10 (Schwarzwald), UG 11 (Südwestdeutsches Bergland), UG 12 (Fränkisches Hügelland), UG 13 (Schwäbische Alb), UG 17 (Südliches Alpenvorland) und UG 21 (Hessisches Bergland). Ursprungsregionen (Herkunftsgebiete) basierend auf Prasse, R., Kunzmann, D. und R. Schröder (2010); grafische Umsetzung: D. Kunzmann.

Anhang 2: Tabellen

TABELLE A1: WILDARTENKOMPONENTE FÜR DIE MASSNAHME FAKT II E8 FÜR ÖKOLOGISCH WIRTSCHAFTENDE BETRIEBE FÜR DIE MISCHUNGEN „LEBENDIGER ACKER TROCKEN FAKT II E8“ UND „LEBENDIGER ACKER FRISCH FAKT II E8“

Hierzu muss regionalisiertes Wildpflanzensaatgut verwendet werden, für das es voraussichtlich ab 2023 eine Allgemeinverfügung geben wird.

Deutscher Name	Botanischer Name	Lebendiger Acker trocken FAKT II E8-Wildartenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. %	Lebendiger Acker frisch FAKT II E8-Wildartenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. %
Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	2.4	3.4
Kleiner Odermenning	<i>Agrimonia eupatoria</i>	1	0
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	1.2	0
Wiesenkerbel	<i>Anthriscus sylvestris</i>	0	2
Echte Winterkresse	<i>Barbarea vulgaris</i>	2.4	2.8
Wiesenkümmel	<i>Carum Carvi</i>	3.5	4.2
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	4.7	5.6
Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	4.7	5.6
Skabiosenflockenblume	<i>Centaurea scabiosa</i>	0.5	0
Gemeine Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	6.8	9
Wirbeldost	<i>Clinopodium vulgare</i>	0.2	0
Wiesenspippau	<i>Crepis biennis</i>	0	4.2
Wiesen-Kammgras/Ruchgras	<i>Cynosurus cristatus/ u. U. Antoxanthum odoratum</i>	5	8.4
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	4.7	4.8
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0.5	0.6
Gemeiner Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	2.4	2.8
Weißes Labkraut	<i>Galium album ssp. Album</i>	3.1	4.2
Echtes Labkraut	<i>Galium verum ssp. Verum</i>	1.9	0
Wiesen-Bärenklau	<i>Heracleum sphondylium</i>	0	0.6
Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	0.7	0
Färberwaid	<i>Isatis tinctoria</i>	0.2	0
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	0	0.8
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	2.4	4.2
Gemeines Leinkraut	<i>Linaria vulgaris Mill.</i>	0.2	0
Kuckucks-Lichtnelke	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	0	1.4
Gewöhnlicher Blutweiderich	<i>Lythrum salicaria</i>	0	1
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	1.4	0
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris ssp. Sylvestris</i>	0	1.7
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	0	5.6
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	4.7	0
Saat-Espartette	<i>Onobrychis vicifolia</i>	14.9	0
Gewöhnlicher Dost	<i>Origanum vulgare</i>	0.5	0
Klatschmohn	<i>Papaver rhoeas</i>	4.7	5.6
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	2.4	2.8
Große Bibernelle	<i>Pimpinella major</i>	0	0.8
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	5.7	6.2
Mittlerer Wegerich	<i>Plantago media</i>	0.7	0
Gemeine Braunelle	<i>Prunella vulgaris</i>	0.5	0.8
Färberresede	<i>Reseda luteola</i>	0.7	0
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	2.1	0
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	4.7	0
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica Clairv.</i>	0	2.2
Weißer Lichtnelke	<i>Silene latifolia ssp. alba (Mill.)</i>	1.9	0
Traubenkropf-Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	3.5	5.6
Acker-Senf	<i>Sinapsis arvensis</i>	0	2.8
Echte Goldrute	<i>Solidago virgaurea</i>	2.6	0
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	0	0.3
Mehlige Königskerze u.U Schwarze Königskerze	<i>Verbascum lychnitis; u.U. Verbascum nigrum</i>	0.5	0

TABELLE A2: WILDARTENKOMPONENTE FÜR DIE MASSNAHME FAKT II E8 FÜR ÖKOLOGISCH WIRTSCHAFTENDE BETRIEBE FÜR DIE MISCHUNGEN „BLÜHENDE LANDSCHAFT MEHRJÄHRIG SÜD FAKT II E8“ UND „BLÜHENDE LANDSCHAFT MEHRJÄHRIG WEST FAKT II E8“

Hierzu muss regionalisiertes Wildpflanzensaatgut verwendet werden, für das in 2023 voraussichtlich eine Allgemeinverfügung geben wird. Die Mischungen sind für die Spätsommer- und Frühljahrsaussaat und jeweilige Kulturartenkomponente geeignet (siehe Tab. A4).

Deutscher Name	Botanischer Name	Blühende Landschaft mehrjährig West FAKT II E8, Wildartenkomponente für West-Baden-Württemberg; Gew. %	Blühende Landschaft mehrjährig Süd FAKT II E8, Wildartenkomponente für Süd-Baden-Württemberg; Gew. %
Gemeine Schafgarbe	<i>Achillea millefolium</i>	2	2.5
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	2.5	2.5
Acker-Glockenblume	<i>Campanula rapunculoides</i>	0	0.3
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	15	15.5
Wiesenflockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	1.7	2.5
Gemeine Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	3.8	5
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	4.5	5
Raue Nelke	<i>Dianthus armeria</i>	1	0
Gemeiner Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	3.7	3.7
Johanniskraut	<i>Hypericum perforatum</i>	0.8	1.2
Färberwaid	<i>Isatis tinctoria</i>	1.3	1.3
Acker-Witwenblume	<i>Knautia arvensis</i>	0.8	1
Wiesen-Margerite	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	5	6.2
Moschusmalve	<i>Malva moschata</i>	1	1
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris ssp. Sylvestris</i>	6.2	5
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	1.3	1.3
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	2.5	1.2
Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	3.8	0
Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	8.2	8.3
Gewöhnlicher Dost	<i>Origanum vulgare</i>	0.5	0.5
Klatschmohn	<i>Papaver rhoeas</i>	5	4.2
Pastinak	<i>Pastinaca sativa</i>	1.7	2.5
Spitz-Wegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	4.7	5
Silber-Fingerkraut	<i>Potentilla argentea</i>	1.2	0
Gelbe Resede	<i>Reseda lutea</i>	0.5	0.5
Färberresede	<i>Reseda luteola</i>	0.8	0.8
Wiesensalbei	<i>Salvia pratensis</i>	2.5	3
Kleiner Wiesenknopf	<i>Sanguisorba minor</i>	5	5
Echtes Seifenkraut	<i>Saponaria officinalis</i>	2	1.2
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica Clairv.</i>	1.5	2
Weißer Lichtnelke	<i>Silene latifolia ssp. alba (Mill.)</i>	2	2
Traubenkropf-Leimkraut	<i>Silene vulgaris</i>	3.2	3.7
Ackersenf	<i>Sinapsis arvensis</i>	2.5	3.3
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	0.3	0.3
Kleinblütige Königskerze	<i>Verbascum thapsus</i>	0.7	1.3
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0.8	1.2

TABELLE A3: ZUGEHÖRIGE KULTURARTENKOMPONENTE FÜR DIE MISCHUNGEN „LEBENDIGER ACKER TROCKEN/FRISCH FAKT II E8“

Deutscher Name	Botanischer Name	Lebendiger Acker trocken FAKT II E8-Kulturartenkomponente für Öko-Landwirte; Gew. %	Lebendiger Acker frisch FAKT II E8-Kulturartenkomponente für Öko-Landwirte, Gew. %
Dill	<i>Anethum graveolens</i>	5	5.5
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	4.4	4.7
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	17.2	15.6
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3.5	3
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	17.4	20
Öllein, Saatlein	<i>Linum usitatissimum</i>	25.8	23.4
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	0	1.7
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	7	4.7
Büschelschön	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	8.7	8.6
Sommerwicke, Saatwicke	<i>Vicia sativa L.</i>	11	12.8

TABELLE A4: ZUGEHÖRIGE KULTURARTENKOMPONENTE FÜR DIE MISCHUNGEN „BLÜHENDE LANDSCHAFT SÜD/WEST FAKT II E8“, ENTWEDER FÜR DIE FRÜHJAHRSS- ODER SPÄTSOMMERAUSSAAT

Die Mischungen sind mit beiden o. g. Mischungen kombinierbar (Tabelle A2).

Deutscher Name	Botanischer Name	Blühende Landschaft mehrjährig Süd&West; Kulturartenkomponente für Spätsommersaat FAKT II E8; Gew. %	Blühende Landschaft mehrjährig Süd&West; Kulturartenkomponente für Frühjahrsaat FAKT E 8; Gew. %
Ringelblume	<i>Calendula officinalis</i>	7	10
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	7	4.8
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	9	4.8
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	0	15
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	7	0
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	0	15
Gartenkresse	<i>Lepidium sativum</i>	5	0
Öllein, Saatlein	<i>Linum usitatissimum</i>	0	14.5
Hornklee	<i>Lotus corniculatus</i>	4	2.5
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	5	3.4
Büschelschön	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	0	8.3
Wintererbse	<i>Pisum sativum</i>	22	0
Weißer Senf	<i>Sinapis alba</i>	0	3.4
Inkarnatklée	<i>Trifolium incarnatum</i>	12	10
Winter-Ackerbohne	<i>Vicia faba</i>	22	0
Sommerwicke	<i>Vicia sativa L.</i>	0	8.3

TABELLE A5: ZULÄSSIGE WILDPFLANZENMISCHUNGEN FÜR DIE FAKT II-MASSNAHMEN E14 UND E15.

Veitshöchheimer Hanfmix

Art		Gewichts-%
Amaranth	<i>Amaranth Bärenkrafft</i>	1.5
Dill	<i>Anethum graveolens</i>	2
Faserhanf	<i>Cannabis sativa</i>	13
Färber-Mädhenaugen	<i>Coreopsis tinctoria</i>	2
Schmuckkörbchen	<i>Cosmos bipinnatus</i>	1.5
Sonnenblume mehrköpfig	<i>Helianthus annuus</i>	5
Faser-Lein	<i>Linum usitatissimum</i>	3
Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	3.5
Mohrenhirse	<i>Sorghum bicolor</i>	8.5
Färber-Kamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	1
Große Klette	<i>Arctium lappa</i>	5.5
Sibirisches Herzgespann	<i>Leonurus japonicus</i>	1
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	1
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	1.5
Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	2.5
Eselsdistel	<i>Onopordon acanthium</i>	4.5
Nachtkerze	<i>Oenothera biennis</i>	3
Feigenblättrige Stockrose	<i>Alcea ficifolia</i>	4
Gelbe Riesenflockenblume	<i>Centaurea macrocephala</i>	1.5
Pannonische Flockenblume	<i>Centaurea pannonica</i>	3.5
Wiesenbärenklau	<i>Heracleum sphondyleum</i>	0.5
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	4
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	12
Eibisch	<i>Althea officinalis</i>	2
Echtes Labkraut	<i>Galium verum</i>	1
Herzgespann	<i>Leonurus cardiaca</i>	3
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	3
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	3.5
Muskatellersalbei	<i>Salvia sclarea</i>	1.5
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0.5

Wildpflanzenmischung (Becker-Schoel)

Art		Gewichts-%
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	1
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	0.5
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	3
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	10
Bokharaklee gelb	<i>Melilotus albus</i>	10
Esparsette in Hülsen	<i>Onobrychis viciifolia</i>	12.5
Buchweizen	<i>Fagopyron esculentum</i>	6
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	4
Platterbse	<i>Lathyrus spec.</i>	3
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	2
Färberdistel	<i>Carthamis tinctoria</i>	2
Borretsch	<i>Borago officinalis</i>	2
Kümmel	<i>Carum carvi</i>	3
Echter Dill	<i>Anethum graveolens</i>	3
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	10
Winterwicke	<i>Vicia villosa</i>	10
Schwedenklee	<i>Trifolium hybridum</i>	7
Sudangras	<i>Sorghum sudanense</i>	7
Markstammkohl	<i>Brassica oleracea var. medullosa</i>	1

TABELLE A5: ZULÄSSIGE WILDPFLANZENMISCHUNGEN FÜR DIE FAKT II-MASSNAHMEN E14 UND E15. (FORTSETZUNG)

Biogas BG70

Art		Gewichts-%
Buchweizen	<i>Fagopyron esculentum</i>	8
Quirlmalve	<i>Malva verticillata</i>	7,5
Sonnenblume einköpfig	<i>Helianthus annuus</i>	8
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	6,5
Eibisch	<i>Althea officinalis</i>	7,5
Färberkamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	1,5
Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,5
Flockenblume	<i>Centaurea jacea/nigra</i>	7
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	1,5
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	0,5
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,5
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	0,5
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3,5
Alant	<i>Inula helenium</i>	3,5
Futtermalve	<i>Malva sylvestris</i>	6
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	2
Weißer Steinklee Adela	<i>Melilotus albus</i>	5
Weißer Steinklee Krajova	<i>Melilotus albus</i>	5
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	10
Esparssette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	8
Färber-Wau	<i>Reseda luteola</i>	0,3
Weißer Lichtnelke	<i>Silene latifolia</i>	1
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	1
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	5
Königskerze	<i>Verbascum spec.</i>	0,2

Biogas BG 90

Art		Gewichts-%
Echter Eibisch	<i>Althea officinalis</i>	7,5
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	1,5
Gew. Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,5
Flockenblume	<i>Centaurea jacea/nigra</i>	7
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	1,5
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	0,5
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,5
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	0,5
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	3,5
Mauretanische Malve	<i>Malva mauritanica</i>	3,5
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	6
Saat-Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	2
Weißer Steinklee Adela	<i>Melilotus albus</i>	5
Weißer Steinklee Krajova	<i>Melilotus albus</i>	5
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	10
Saat-Esparssette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	8
Färber-Wau	<i>Reseda luteola</i>	0,3
Weißer Lichtnelke	<i>Silene alba</i>	1
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	1
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	5
Königskerze	<i>Verbascum spec.</i>	0,2
Ansaathilfe		30

TABELLE A5: ZULÄSSIGE WILDPFLANZENMISCHUNGEN FÜR DIE FAKT II-MASSNAHMEN E14 UND E15. (FORTSETZUNG)

Biogas BW (Rieger-Hofmann)

Art		Gewichts-%
Echter Eibisch	<i>Altheae officinalis</i>	6.3
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	13.3
Echter Alant	<i>Inula helenium</i>	2.1
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	7.8
Buchweizen	<i>Fagopyron esculentum</i>	20
Rainfarn-Phazelie	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	3
Sonnenblume	<i>Helianthus annuus</i>	7.5
Gew. Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0.7
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	3.4
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	6
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	1.1
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0.7
Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	1.4
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	4.2
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	3
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	3
Espарsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	10.8
Färber-Wau	<i>Reseda luteola</i>	0.7
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	0.7
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	3.6
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0.7

Biogas-Mischung Spätsommeransaat Süd 2023 (Rieger-Hofmann)

Art		Gewichts-%
Echter Eibisch	<i>Althaea officinalis</i>	3,0
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	2,0
Große Klette	<i>Arctium lappa</i>	0,4
Gewöhnlicher Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,7
Leindotter	<i>Camelina sativa</i>	3,0
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	4,4
Gewöhnliche Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	6,0
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	1,1
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,7
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	1,4
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	9,6
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	11,5
Echtes Herzgespann	<i>Leonurus cardiaca</i>	2,8
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	4,2
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	5,8
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	3,0
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	3,0
Saat-Espарsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	11,1
Petersilie	<i>Petroselinum crispum</i>	3,0
Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	3,0
Färber-Resede	<i>Reseda luteola</i>	0,5
Waldstaudenroggen	<i>Secale multicaule</i>	3,0
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	0,5
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	3,6
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0,7
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0,7

TABELLE A5: ZULÄSSIGE WILDPFLANZENMISCHUNGEN FÜR DIE FAKT II-MASSNAHMEN E14 UND E15. (FORTSETZUNG)

Biogas-Mischung Frühlingsansaat Süd 2024 (Rieger-Hofmann)

Art		Gewichts-%
Echter Eibisch	<i>Althaea officinalis</i>	3,0
Färber-Hundskamille	<i>Anthemis tinctoria</i>	2,0
Große Klette	<i>Arctium lappa</i>	0,4
Gewöhnlicher Beifuß	<i>Artemisia vulgaris</i>	0,7
Wiesen-Flockenblume	<i>Centaurea jacea</i>	4,4
Gewöhnliche Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	6,0
Wilde Möhre	<i>Daucus carota</i>	1,1
Wilde Karde	<i>Dipsacus fullonum</i>	0,7
Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Echium vulgare</i>	1,4
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	20,3
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	13,3
Sonnenblume, Pollensorte	<i>Helianthus annuus</i>	8,5
Echtes Herzgespann	<i>Leonurus cardiaca</i>	2,8
Wilde Malve	<i>Malva sylvestris</i>	4,2
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	5,8
Weißer Steinklee	<i>Melilotus albus</i>	3,0
Gelber Steinklee	<i>Melilotus officinalis</i>	3,0
Saat-Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	11,1
Phacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	3,0
Färber-Resede	<i>Reseda luteola</i>	0,5
Rote Lichtnelke	<i>Silene dioica</i>	0,5
Rainfarn	<i>Tanacetum vulgare</i>	3,6
Schwarze Königskerze	<i>Verbascum nigrum</i>	0,7

Extensive Biomassepflanzen Öko (Semo Bio)

Art		Qualität	Gewichts-%
Buchweizen	<i>Fagopyrum esculentum</i>	Öko	8
Sonnenblumen	<i>Helianthus annuus</i>	Öko	8
Bokharaklee	<i>Melilotus albus</i>	gelbbl. Öko	10
Rispenhirse	<i>Panicum spec.</i>	Unikum Öko	7
Hanf	<i>Cannabis sativa</i>	USO 31 Öko	10
Dill	<i>Anethum graveolens</i>	Öko	2
Spitzwegerich	<i>Plantago lanceolata</i>	Öko	1
Wegwarte	<i>Cichorium intybus</i>	Öko	1
Färberdistel	<i>Carthamus tinctoria</i>	Öko	2
Platterbse	<i>Lathyrus spec.</i>	Öko	10
Borretsch	<i>Borago officinalis</i>	Öko	1
Fenchel	<i>Foeniculum vulgare</i>	Öko	3
Koriander	<i>Coriandrum sativum</i>	Öko	5
Kümmel	<i>Carum carvi</i>	Öko	2
Luzerne	<i>Medicago sativa</i>	Öko	5
Rotklee	<i>Trifolium pratense</i>	Öko	5
Weißklee	<i>Trifolium repens</i>	Öko	1
Inkarnatklee	<i>Trifolium incarnatum</i>	Öko	5
Serradella	<i>Ornithopus sativa</i>	Öko	4
Esparsette	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Öko	10

TABELLE A6: AB 2024 ZULÄSSIGE ARTEN FÜR ÖR1B/C.

Die Listen stehen derzeit noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung in der GAPRefVo, werden jedoch bereits durch die Saatgutfirmen berücksichtigt.

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung	Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Gruppe A			
<i>Alliaria petiolata</i>	Lauchhederich	<i>Lepidium campestre</i>	Feld-Kresse
<i>Anagallis arvensis</i>	Acker-Gauchheil	<i>Lepidium sativum</i>	Kresse
<i>Anethum graveolens</i>	Dill	<i>Linum utatissimum</i>	Lein
<i>Aphanes arvensis</i>	Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel	<i>Malva neglecta</i>	Weg-Malve
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Acker-Schmalwand	<i>Myosotis arvensis</i>	Acker-Vergissmeinnicht
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Quendel-Sandkraut	<i>Odontites vulgaris</i>	Roter Zahntrost
<i>Borago officinalis</i>	Borretsch	<i>Papaver dubium</i>	Saat-Mohn
<i>Calendula officinalis</i>	Ringelblume	<i>Phacelia tanacetifolia</i>	Rainfarn-Phazelie
<i>Cerastium glomeratum</i>	Knäuel-Hornkraut	<i>Polygonum arenastrum</i>	Gleichblättriger Vogelknöterich
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Fünfmänniges Hornkraut	<i>Raphanus sativus</i>	Ölrettich
<i>Crepis capillaris</i>	Kleinköpfiger Pippau	<i>Reseda lutea</i>	Gelber Wau
<i>Cuscuta europaea</i>	Europäische Seide	<i>Sisymbrium officinale</i>	Wege-Rauke
<i>Erysimum cheiranthoides</i>	Acker-Schöterich	<i>Spergula arvensis</i>	Acker-Spergel
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Sonnenwend-Wolfsmilch	<i>Spergularia rubra</i>	Rote Schuppenmiere
<i>Euphorbia peplus</i>	Garten-Wolfsmilch	<i>Torilis japonica</i>	Gewöhnlicher Klettenkerbel
<i>Fagopyrum esculentum</i>	Buchweizen	<i>Trifolium arvense</i>	Hasen-Klee
<i>Fallopia dumetorum</i>	Hecken-Flügelknöterich	<i>Trifolium campestre</i>	Feld-Klee
<i>Fumaria officinalis</i>	Gewöhnlicher Erdrauch	<i>Trifolium dubium</i>	Kleiner Klee
<i>Galeopsis bifida</i>	Kleinblütiger Hohlzahn	<i>Valerianella carinata</i>	Gekieltes Rapünzchen
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sumpf-Ruhrkraut	<i>Valerianella locusta</i>	Gewöhnliches Rapünzchen
<i>Helianthus annuus</i>	Sonnenblume	<i>Veronica agrestis</i>	Acker-Ehrenpreis
<i>Lamium purpureum</i>	Purpurrote Taubnessel	<i>Veronica arvensis</i>	Feld-Ehrenpreis
<i>Lapsana communis</i>	Gewöhnlicher Rainkohl		
Gruppe B			
<i>Achillea millefolium</i>	Gewöhnliche Schafgarbe	<i>Lathyrus tuberosus</i>	Knollen-Platterbse
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Kleiner Odermennig	<i>Leontodon autumnalis</i>	Herbstlöwenzahn
<i>Ajuga reptans</i>	Kriech-Günsel	<i>Leontodon saxatilis</i>	Nickender Löwenzahn
<i>Allium oleraceum</i>	Gemüse-Lauch	<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Wiesen-Margerite
<i>Allium vineale</i>	Weinbergs-Lauch	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Frühe Margerite
<i>Angelica sylvestris</i>	Wald-Engelwurz	<i>Linaria vulgaris</i>	Gewöhnliches Leinkraut
<i>Anthemis tinctoria</i>	Färber-Hundskamille	<i>Lotus corniculatus</i>	Hornschotenklee
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	<i>Lotus pedunculatus</i>	Sumpf-Hornklee
<i>Arctium lappa</i>	Große Klette	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke
<i>Arctium minus</i>	Kleine Klette	<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich
<i>Arctium tomentosum</i>	Filz-Klette	<i>Lythrum salicaria</i>	Gewöhnlicher Blutweiderich
<i>Asparagus officinalis</i>	Gemüse-Spargel	<i>Malva alcea</i>	Spitzblatt-Malve
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Süßer Tragant	<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve
<i>Ballota nigra</i>	Gewöhnliche Schwarznessel	<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve
<i>Bellis perennis</i>	Ausdauerndes Gänseblümchen	<i>Medicago falcata</i>	Sichel-Luzerne
<i>Bistorta officinalis</i>	Schlangen-Wiesenknöterich	<i>Medicago sativa</i>	Luzerne
<i>Bryonia dioica</i>	Rotbeerige Zaunrübe	<i>Melilotus albus</i>	Weißer Steinklee
<i>Campanula persicifolia</i>	Pfirsichblättrige Glockenblume	<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpf-Vergissmeinnicht
<i>Campanula rapunculoides</i>	Acker-Glockenblume	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Saat-Esparsette
<i>Cardamine pratensis</i>	Wiesen-Schaumkraut	<i>Ononis repens</i>	Kriechende Hauhechel
<i>Carduus crispus</i>	Krause Distel	<i>Onopordum acanthium</i>	Gewöhnliche Eselsdistel
<i>Carum carvi</i>	Kümmel	<i>Origanum vulgare</i>	Gewöhnlicher Dost
<i>Cerastium arvense</i>	Acker-Hornkraut	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Dolden-Milchstern
<i>Cerastium holosteoides</i>	Gewöhnliches Hornkraut	<i>Pastinaca sativa</i>	Gewöhnlicher Pastinak
<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Rüben-Kälberkopf	<i>Petasites hybridus</i>	Gewöhnliche Pestwurz
<i>Chelidonium majus</i>	Schöllkraut	<i>Picris hieracioides</i>	Gewöhnliches Bitterkraut

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung	Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
<i>Chondrilla juncea</i>	Großer Knorpellattich	<i>Pimpinella major</i>	Große Pimpinelle
<i>Cichorium intybus</i>	Gewöhnliche Wegwarte	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Pimpinelle
<i>Clinopodium vulgare</i>	Wirbeldost	<i>Potentilla anserina</i>	Gänse-Fingerkraut
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	<i>Potentilla argentea</i>	Silber-Fingerkraut
<i>Cruciata laevipes</i>	Gewimpertes Kreuzlabkraut	<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	<i>Potentilla recta</i>	Aufrechtes Fingerkraut
<i>Digitalis purpurea</i>	Roter Fingerhut	<i>Potentilla reptans</i>	Kriechendes Fingerkraut
<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Braunelle
<i>Dipsacus pilosus</i>	Behaarte Karde	<i>Reseda luteola</i>	Färber-Wau
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	<i>Saponaria officinalis</i>	Echtes Seifenkraut
<i>Epilobium angustifolium</i>	Schmalblättriges Weidenröschen	<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoten-Braunwurz
<i>Epilobium hirsutum</i>	Behaartes Weidenröschen	<i>Securigera varia</i>	Bunte Beilwicke
<i>Epilobium lamyi</i>	Graugrünes Weidenröschen	<i>Sedum acre</i>	Scharfer Mauerpfeffer
<i>Epilobium montanum</i>	Berg-Weidenröschen	<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer
<i>Epilobium tetragonum</i>	Vierkantiges Weidenröschen	<i>Silene dioica</i>	Rote Lichtnelke
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Gewöhnlicher Wasserdost	<i>Silene latifolia</i>	Breitblättrige Lichtnelke
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	<i>Silene vulgaris</i>	Gemeines Leimkraut
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	<i>Solidago virgaurea</i>	Gewöhnliche Goldrute
<i>Foeniculum vulgare</i>	Fenchel	<i>Stachys sylvatica</i>	Wald-Ziest
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	<i>Stellaria aquatica</i>	Wasser-Sternmiere
<i>Geranium pratense</i>	Wiesen-Storchschnabel	<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn
<i>Geum urbanum</i>	Echte Nelkenwurz	<i>Teucrium scorodonia</i>	Salbei-Gamander
<i>Glechoma hederacea</i>	Gewöhnlicher Gundermann	<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesen-Bocksbart
<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	Wald-Ruhrkraut	<i>Trifolium medium</i>	Zickzack-Klee
<i>Heracleum sphondylium</i>	Gewöhnliche Bärenklau	<i>Trifolium pratense</i>	Rotklee
<i>Hieracium lachenalii</i>	Gewöhnliches Habichtskraut	<i>Trifolium repens</i>	Weißklee
<i>Hieracium laevigatum</i>	Glattes Habichtskraut	<i>Verbascum densiflorum</i>	Großblütige Königskerze
<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	<i>Verbascum lychnitis</i>	Mehlige Königskerze
<i>Hieracium piloselloides</i>	Florentiner Habichtskraut	<i>Verbascum nigrum</i>	Schwarze Königskerze
<i>Hieracium umbellatum</i>	Doldiges Habichtskraut	<i>Verbascum phlomoides</i>	Windblumen-Königskerze
<i>Hypericum hirsutum</i>	Behaartes Hartheu	<i>Verbascum thapsus</i>	Kleinblütige Königskerze
<i>Hypericum perforatum</i>	Tüpfel-Hartheu	<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander-Ehrenpreis
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewöhnliches Ferkelkraut	<i>Veronica officinalis</i>	Echter Ehrenpreis
<i>Knautia arvensis</i>	Wiesen-Witwenblume	<i>Vicia angustifolia</i>	Schmalblättrige Wicke
<i>Lamium album</i>	Weißes Taubnessel	<i>Vicia cracca</i>	Vogel-Wicke
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke
<i>Lathyrus pratensis</i>	Wiesen-Platterbse	<i>Vicia tenuifolia</i>	Feinblättrige Wicke
<i>Lathyrus sylvestris</i>	Wald-Platterbse	<i>Viola hirta</i>	Behaartes Veilchen

IMPRESSUM

Herausgeber: Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Neßlerstr. 25, 76227 Karlsruhe, Tel.: 0721/9468-0, Fax: 0721/9468-209, E-Mail: poststelle@ltz.bwl.de, Internet: www.ltz-augustenberg.de

Autorinnen und Autoren: Dr. Jörn Breuer, Dr. Andreas Butz, Robin Maier, Dr. Kurt Möller, Jürgen Ott, Dr. Vanessa Schulz, Kerstin Stolzenburg, Dr. Erich Unterseher, Dr. Julia Walter (alle LTZ); Jörg Messner, Wilhelm Wurth (beide LAZBW);

Redaktion: Dr. Julia Walter; Titelbild: Dr. Erich Unterseher; Layout: Jörg Jenrich

11/2023